

Il tempo previsto nei prossimi giorni


Evoluzione Generale Condizioni di alta pressione grazie ad un promontorio anticiclonico che si espande dal nord Africa e interessa l'Europa centro-occidentale: sul Veneto cielo in prevalenza sereno e aria progressivamente più calda. Temperature superiori alla media del periodo anche di molto nei valori massimi da giovedì.

www.arpav.veneto.it/previsioni/it/html/index.php

	mercoledì 21		giovedì 22		venerdì 23	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Probabilità Precipitazioni	0%	0/20%	0%	0/20%	0%	0/20%
Venti	Deboli regime di brezza		Deboli regime di brezza		Deboli regime di brezza	
Temperatura	Min ↑	Max ↑	Min ↑	Max ↑	Min =	Max =

Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.




Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio	base 10 dal 1 aprile
2017	2045	2020,1
2016 storica	1681	611,7
2016 storica	534,7	437,9
GR	1973	1943,6
		619,1
		543,1

GL = Conegliano; GR = Gaiarine


Indice di fienagione



Peronospora Vite

Stazione di Gaiarine	data inf.	Rischio	Fine inc.	% inc.
	12/06/2017	Lieve	17/06/2017	100%
	10/06/2017	Moderata	15/06/2017	100%
	09/06/2017	Moderata	14/06/2017	100%
	07/06/2017	Grave	12/06/2017	100%
	06/06/2017	Moderata	12/06/2017	100%
	02/06/2017	Moderata	07/06/2017	100%

Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



Bollettino Peronospora Vite

www.arpav.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/file-e-allegati/peronospora-vite/Vitimetee.pdf

Oidio Vite

Stazione di Gaiarine	Data	Indice di Rischio
	15/06/17	20
	16/06/17	21
	17/06/17	20
	18/06/17	19
	19/06/17	18

Bollettino Oidio Vite

www.arpav.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/file-e-allegati/peronospora-vite/Vitimetee2.pdf

Bollettino colture erbacee

www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60

Vigneto Veneto

Andamento e previsioni produttive

www.venetoagricoltura.org/upload/Europa%20Direct/Conegliano%2021%20giugno%202017/invito_21_6_17.pdf

Dai Servizi Fitosanitari

- settore cerealicolo -

Mais Si segnala, in diverse località della regione, presenza massiccia di adulti di Diabrotica, in particolare sulle appezzamenti in monosuccessione, seminati molto presto. Si segnalano anche allettamenti a seguito di forti eventi ventosi, per i danni provocati dalle larve all'apparato radicale. Per valutare la reale necessità di un intervento abbattente, è necessario avere una percezione oggettiva del grado d'infestazione e questo è possibile solo con installazione delle trappole cromotropiche gialle a colla (3 per ettaro). Al superamento di 40 adulti di media nelle prime due settimane dall'installazione delle trappole, si consiglia di intervenire con prodotti abbattenti prima della fioritura.

- settore orticolo: patata/fagiolino -


- settore frutticolo -

Pomacee/Drupacee(Pesco)


- settore olivicolo -

www.arpav.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/bollagr/veneto.html

Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.



Evapotraspirazione Potenziale (mm/g) ultimi 8 giorni



Il proverbio della settimana

Se gh'è neve piova a S.Romualdo, agosto caldo

La fase lunare

Luna calante



Il prossimo bollettino

venerdì 23 giugno