

Il tempo previsto nei prossimi giorni


Evoluzione Generale La pressione è in diminuzione per il transito di una perturbazione nella giornata di giovedì, poi sabato per l'arrivo di un impulso freddo. Il tempo si manterrà variabile a tratti perturbato; il calo termico sarà sensibile con temperature che si porteranno su valori ben al di sotto della norma, soprattutto da domenica. Da lunedì le minime in pianura scenderanno su valori prossimi allo zero.

www.arpav.veneto.it/previsioni/it/html/index.php

	venerdì 16		sabato 17		domenica 18	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Probabilità Precipitazioni	0/20%		0%		60/80%	
Venti	Deboli/Moderati-Variabili		Moderati-Orientali		Moderati-Orientali	
Temperatura	Min ↓	Max ↑	Min ↓	Max ↓	Min ↓	Max ↓

Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio		
	2018	2017	storica
AA	394,3	376,3	260
ZA	393,4	369,9	


AA = Agna; ZA = Tribano

Dai Servizi Fitosanitari


- settore frutticolo -
Pomacee

Fase di rigonfiamento gemme, comparsa di punte verdi su varietà di melo a germogliamento precoce - Pink Lady; fase di apertura gemme del pero. Con la comparsa delle punte verdi è possibile il verificarsi di infezioni di Ticchiolatura, in caso di pioggia, anche leggera. Il trattamento va sempre effettuato in via preventiva, quindi prima della pioggia prevista, utilizzando prodotti di CONTATTO, di preferenza RA-MEICI nelle prime fasi (efficaci anche verso i Cancri rameali) e successivamente DITIOCARBAMMATI o altri. Da questo periodo fino a orecchiette di topo si interviene contro la Cocciniglia, utilizzando OLIO MINERALE (che deve essere distanziato di 10 giorni dallo zolfo), PYRIPROXYFEN (facendo attenzione ai dosaggi riportati nei diversi formulati commerciali), BUPROFEZIN (revocato, è ancora possibile l'uso entro il 20 giugno). Si ricorda l'importanza della corretta e completa bagnatura di tutta la pianta; il trattamento va effettuato in condizioni climatiche favorevoli, con giornate asciutte e assenza di vento. In questa fase è consigliato, negli appezzamenti di pero dove lo scorso anno si erano manifestati attacchi di Colpo di fuoco, un attento monitoraggio in modo da completare la pulizia con l'eliminazione delle parti di pianta o delle piante con presenza di Cancri attribuibili alla Batteriosi. INTERVENTI SPECIFICI potrebbero essere richiesti, in qualche appezzamento di pero dove lo scorso anno erano stati segnalati danni da Eriofide vescicoloso. Da orecchiette di topo, su melo, è opportuno iniziare gli interventi con ZOLFO o PRODOTTI SPECIFICI verso l'Oidio negli appezzamenti notoriamente interessati.


Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.




Temperatura suolo varie profondità (°C) ultimi 8 giorni



Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.



Evapotraspirazione Potenziale (mm/g) ultimi 8 giorni



Servizio "Angela"

Allerta gelate tardive

www.arpav.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/servizi/angela-10

Bollettino colture erbacee

Difesa integrata a puntate

www.venetoagricoltura.org/argomento/bollettino-culture-erbacee/

Il proverbio della settimana

Da Sant'Isepo, le sisile passa el teto

La fase lunare

Luna calante



Il prossimo bollettino

lunedì 19 marzo