

Il tempo previsto nei prossimi giorni


Evoluzione Generale Tendenza ad esaurimento della circolazione ciclonica. Tra giovedì e sabato condizioni anticicloniche; non si verificheranno precipitazioni, temperature sopra la media. Domenica avvicinamento di una depressione da nord-est; arriveranno nuvole e poi alcune piogge, temperature in calo.

www.arpav.veneto.it/previsioni/it/html/index.php

	giovedì 18		venerdì 19		sabato 20	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Probabilità Precipitazioni	Nulla 0 %		Nulla 0 %		Nulla 0 %	
Venti	Deboli Variabili		Deboli/Moderati-Nord/Orientali		Deboli/Moderati-Nord/Orientali	
Temperatura	Min ↓	Max ↑	Min ↓	Max =	Min ↓	Max ↓

Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio			base 10 dal 1 aprile		
	2018	2017	storica	2018	2017	storica
AA	4832	4628	4292	2305	2063	1879
ZA	4789	4632		2264	2074	

AA = Agna; ZA = Tribano

Dai Servizi Fitosanitari

- settore cerealicolo -

Frumento In corso la preparazione dei terreni per la semina di questo cereale. Una delle problematiche fitosanitarie emergenti, di questi ultimi anni è rappresentato dal virus del Mosaico comune. L'infezione si manifesta con deperimenti vegetativi, macchie clorotiche fogliari di forma allungata, disposte parallelamente alle nervature. I sintomi vengono spesso erroneamente attribuiti a ristagno d'acqua, carenza di azoto, freddi invernali. Nelle condizioni più favorevoli al virus si ha una forte riduzione della taglia delle piante. La malattia viene trasmessa alle radici del frumento da un "protozoo" che vive nel terreno, la *Polymixa graminis* e le infezioni avvengono nel periodo autunnale in presenza di acqua e con temperature attorno ai 15-16° C. Evitare pertanto nella fase di preparazione del terreno la formazione di avvallamenti favorevoli ai ristagni idrici ma soprattutto ritardare le semine posticipandole a fine ottobre, primi novembre in quanto le temperature sono ancora troppo elevate. L'incidenza della malattia è maggiore sul frumento duro. Al momento dell'acquisto richiedere varietà resistenti /tolleranti, certificate e conciate.


- settore colture industriali -

Colza Le temperature elevate di questo periodo hanno favorito una terza generazione di *Athalia rosae*, (Tentredine delle crucifere), segnalata in diversi appezzamenti della Provincia di Padova. Le larve, che a maturità si presentano di un colore verde scuro, erodono le foglie lasciando le piante scheletrizzate. Se rilevata la presenza, intervenire tempestivamente con INSETTICIDI AUTORIZZATI.

- settore olivicolo -

Fenologia Oramai la fase di invaiatura ha raggiunto mediamente circa il 70% delle olive, la varietà Frantoio mantiene sfumature nero violacee, il Leccino ha olive quasi completamente nere. Il comportamento sulla variazione di colore dell'epidermide e della polpa variano in funzione delle condizioni climatiche, del terreno e dalla varietà. L'accumulo dell'olio nella polpa sta comunque ancora aumentando...


Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.




Precipitazioni (mm) ultimi giorni

stazione/giorni	15/10
Agna	4,2
Tribano	1,6
Sant'Elena	1,8

Indice di fienagione Stazione di Agna



Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.



Eventi calamitosi 2015/17

Apertura termini

www.avepa.it/notizia-dettaglio/-/asset_publisher/HTVg04cXxrd5/content/id/2687865

Servizio "Angela"

Allerta gelate precoci


www.arpav.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/servizi/angela-10

Bollettino colture erbacee

www.venetoagricoltura.org/argomento/bollettino-culture-erbacee/

www.arpav.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/bollagr/veneto.html

Evapotraspirazione Potenziale (mm/g) ultimi 8 giorni



Il proverbio della settimana

Da San Luca, cava la rava e meti la zuca

La fase lunare

Luna crescente



Il prossimo bollettino

giovedì 25 ottobre