

Il tempo previsto nei prossimi giorni


Evoluzione Generale Una depressione presente sul centro Europa si approfondisce sul nord Italia, portando una fase di instabilità con rovesci e temporali, specie tra lunedì e martedì, e un netto calo termico che determinerà clima più fresco almeno fino a mercoledì. Seguirà un nuovo aumento della pressione con tempo stabile, in prevalenza soleggiato e temperature in ripresa.

www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php

	martedì 25		mercoledì 26		giovedì 27	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Probabilità Precipitazioni	0/20%		20/40%		0/20%	
Venti	Deboli Variabili		Deboli Variabili		Deboli Variabili	
Temperatura	Min ↓	Max =	Min =	Max =	Min ↑	Max ↑

Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio			base 10 dal 1 aprile		
	2017	2016	storica	2017	2016	storica
SZ	2896	2836	2464	1188	1086	912,3
RV	2817	2817		1123	1047	

SZ = Salizzole; RV = Roverchiara

Dai Servizi Fitosanitari

- settore orticolo -

Asparago Buona la situazione fitosanitaria. Dalla scorsa settimana si osservano infezioni di RugGINE. Iniziare la difesa con prodotti SPECIFICI bagnando accuratamente tutta la vegetazione. Su asparago bianco si segnala la comparsa di Stemphiliium. Nessuna presenza di Criocera.

Melone Al momento non si segnalano sintomi di Peronospora. Intervenire in caso di previsione di piogge o bagnature prolungate. Presenze diffuse di Oidio con necessità di trattamenti specifici.

Pomodoro da industria L'inizio raccolto è previsto per fine settimana. Peronospora: qualche presenza, in particolare sugli ultimi trapianti, in conseguenza delle piogge di venerdì 14. La difesa deve tener conto dell'epoca di raccolta prevista e delle possibili piogge o bagnature. Qualche limitata presenza di Batteriosi, di Alternaria e di Septoria in zone umide, su impianti irrigati. Per quanto riguarda il Ragnetto rosso, negli impianti in buone condizioni irrigue non sono stati necessari interventi; è da verificare la situazione su impianti medio tardivi, dove non è del tutto esclusa la necessità di un TRATTAMENTO SPECIFICO. Proseguono le catture della Nottua gialla (Heliothis armigera) sulle trappole a feromoni. La soglia di intervento è di 2 piante ogni 30 controllate con presenza di uova o larve.

Su **Porro** e altre colture orticole si segnalano attacchi di Tripide di difficile contenimento.


Orticle in serra Le persistenti elevate temperature hanno favorito attacchi diffusi di Ragnetto rosso sulle diverse colture, in particolare pomodoro e melanzana. Su pomodoro occorre fare attenzione alla presenza di Tuta assoluta, che se non tempestivamente contenuta può diventare di difficile contenimento anche con l'applicazione della CONFUSIONE SESSUALE e di INSETTICIDI. Sempre su pomodoro si può avere comparsa di Oidio. Su melanzana occorre verificare la presenza di Miridi, Lygus, ed intervenire per ridurre i danni sui fiori. Sulle cucurbitacee, zucchini e cetriolo, l'Oidio rimane l'avversità principale.

- settore frutticolo: Pomacee -

- settore olivicolo -


Indice di fienazione

Stazione di Salizzole




FATTORI LIMITANTI LA FIENAGIONE	
venerdì	nessuno
sabato	nessuno
domenica	nessuno
oggi	pioggia, poco sole, elevata umidità
martedì	nessuno
mercoledì	nessuno
giovedì	nessuno


Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.



Evapotraspirazione Potenziale (mm/g) ultimi 8 giorni



Prodotti Fitosanitari

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

www.avepa.it/prodotti-fitosanitari

Utilizzo dei prodotti fitosanitari

www.avepa.it/fitosanitari-utilizzatori

Bollettino colture erbacee

www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60

Il proverbio della settimana

Piova estiva, bon pro a chi ariva

La fase lunare

Luna crescente



Il prossimo bollettino

giovedì 27 luglio