

## Il tempo previsto nei prossimi giorni


**Evoluzione Generale** Nei prossimi giorni la caratteristica meteorologica più rilevante è l'ingresso a sud delle Alpi di masse di aria fredda da nord, con condizioni prevalentemente cicloniche; il tempo sarà inizialmente variabile, con modeste precipitazioni nel fine settimana, e calo termico sensibile da domenica, fino a temperature al di sotto delle medie del periodo.

[www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php](http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php)

	sabato 17		domenica 18		lunedì 19	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
<b>Probabilità Precipitazioni</b>	80/100%	40/60%	40/60%	20/40%	20/40%	20/40%
<b>Venti</b>	Deboli/Moderati da Est		Deboli/Moderati da Est		Deboli/Moderati da Est	
<b>Temperatura</b>	Min ↓	Max ↓	Min ↓	Max ↓	Min ↓	Max ↓

## Informazioni agroclimatiche e territoriali

### Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



### Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio		
	2018	2017	storica
<b>FS</b>	391,4	381,5	297,7
<b>VN</b>	390,1	390,8	

FS = Farra di Soligo; VN = Valdobbiadene

### Precipitazioni (mm) ultimi giorni

stazione/giorni	13/3	14/3	15/3
Farra di Soligo	1,4	0	33
Valdobbiadene	0	0	23
Follina	2,2	1	27,2


## Dai Servizi Fitosanitari

- settore frutticolo -


### Pomacee

Fase di rigonfiamento gemme, comparsa di punte verdi su varietà di melo a germogliamento precoce - Pink Lady; fase di apertura gemme del pero. Con la comparsa delle punte verdi è possibile il verificarsi di infezioni di Ticchiolatura, in caso di pioggia, anche leggera. Il trattamento va sempre effettuato in via preventiva, quindi prima della pioggia prevista, utilizzando prodotti di CONTATTO, di preferenza RAMEICI nelle prime fasi (efficaci anche verso i Cancri rameali) e successivamente DITIOCARBAMMATI o altri. Da questo periodo fino a orecchiette di topo si interviene contro la Cocciniglia, utilizzando OLIO MINERALE (che deve essere distanziato di 10 giorni dallo zolfo), PYRIPROXYFEN (facendo attenzione ai dosaggi riportati nei diversi formulati commerciali), BUPROFEZIN (revocato, è ancora possibile l'uso entro il 20 giugno). Si ricorda l'importanza della corretta e completa bagnatura di tutta la pianta; il trattamento va effettuato in condizioni climatiche favorevoli, con giornate asciutte e assenza di vento. In questa fase è consigliato, negli appezzamenti di pero dove lo scorso anno si erano manifestati attacchi di Colpo di fuoco, un attento monitoraggio in modo da completare la pulizia con l'eliminazione delle parti di pianta o delle piante con presenza di Cancri attribuibili alla Batteriosi. INTERVENTI SPECIFICI potrebbero essere richiesti, in qualche appezzamento di pero dove lo scorso anno erano stati segnalati danni da Eriofide vescicoloso. Da orecchiette di topo, su melo, è opportuno iniziare gli interventi con ZOLFO o PRODOTTI SPECIFICI verso l'Oidio negli appezzamenti notoriamente interessati.

### Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



### Temperatura suolo varie profondità (°C) ultimi 8 giorni



Stazione di Conegliano

## Servizio "Angela"


### Allerta gelate tardive

[www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/servizi/angela-10](http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/servizi/angela-10)


## Bollettino colture erbacee

[www.venetoagricoltura.org/argomento/bollettino-colture-erbacee/](http://www.venetoagricoltura.org/argomento/bollettino-colture-erbacee/)

### Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.



### Evapotraspirazione Potenziale (mm/g) ultimi 8 giorni



### Il proverbio della settimana

Da Sant'Isepo, le sisile passa el teto

### La fase lunare

Luna calante



### Il prossimo bollettino

martedì 20 marzo