

Il tempo previsto nei prossimi giorni


Evoluzione Generale Condizioni di alta pressione grazie ad un promontorio anticiclonico che si espande dal nord Africa e interessa l'Europa centro-occidentale: sul Veneto cielo in prevalenza sereno e aria progressivamente più calda. Temperature superiori alla media del periodo anche di molto nei valori massimi da giovedì.

www.arpav.veneto.it/previsioni/it/html/index.php

	mercoledì 21		giovedì 22		venerdì 23	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Probabilità Precipitazioni	0%	20/40%	0%	0/20%	0%	0/20%
Venti	Deboli regime di brezza		Deboli regime di brezza		Deboli regime di brezza	
Temperatura	Min ↑	Max ↑	Min ↑	Max ↑	Min =	Max =

Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.




Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio	base 10 dal 1 aprile				
	2017	2016	storica	2017	2016	
ML	2026	1943,3	1734	631,2	527,8	456,1
BZ	2046	1969,3		607,8	511,1	

ML = Malo; BZ = Breganze

Indice di fienagione



Peronospora Vite


Stazione di Breganze			
data inf.	Rischio	Fine inc.	% inc.
14/06/2017	Moderata	19/06/2017	100%
07/06/2017	Moderata	12/06/2017	100%
05/06/2017	Lieve	11/06/2017	100%
15/05/2017	Lieve	20/05/2017	100%
13/05/2017	Lieve	18/05/2017	100%

Bollettino Peronospora Vite

www.arpav.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/file-e-allegati/peronospora-vite/Vitimeteo.pdf

FATTORI LIMITANTI LA FIENAGIONE	
sabato	nessuno
domenica	nessuno
lunedì	nessuno
oggi	nessuno
mercoledì	nessuno
giovedì	nessuno
venerdì	nessuno

Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



Oidio Vite

Stazione di Breganze	
Data	Indice di Rischio
15/06/17	12
16/06/17	14
17/06/17	16
18/06/17	15
19/06/17	15

Bollettino Oidio Vite

www.arpav.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/file-e-allegati/peronospora-vite/Vitimeteo2.pdf

Bollettino colture erbacee

www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDX=6&SIDX=120&IDDX=60

Vigneto Veneto

Andamento e previsioni produttive

www.venetoagricoltura.org/upload/Europe%20Direct/Comigliano%2021%20giugno%202017/invito_21_6_17.pdf

Dai Servizi Fitosanitari

- settore cerealicolo -

Mais Si segnala, in diverse località della regione, presenza massiccia di adulti di Diabrotica, in particolare sulle appezzamenti in monosuccessione, seminati molto presto. Si segnalano anche allettamenti a seguito di forti eventi ventosi, per i danni provocati dalle larve all'apparato radicale. Per valutare la reale necessità di un intervento abbattente, è necessario avere una percezione oggettiva del grado d'infestazione e questo è possibile solo con installazione delle trappole cromotropiche gialle a colla (3 per ettaro). Al superamento di 40 adulti di media nelle prime due settimane dall'installazione delle trappole, si consiglia di intervenire con prodotti abbattenti prima della fioritura.

- settore orticolo: patata/fagiolino -


- settore frutticolo -

Pomacee/Drupacee(Pesco)


- settore olivicolo -

www.arpav.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/bollagr/veneto.html

Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.



Evapotraspirazione Potenziale (mm/g) ultimi 8 giorni



Il proverbio della settimana

Se gh'è neve piova a S.Romualdo, agosto caldo

La fase lunare

Luna calante



Il prossimo bollettino

venerdì 23 giugno