

## Il tempo previsto nei prossimi giorni


**Evoluzione Generale** Condizioni di alta pressione grazie ad un promontorio anticiclonico che si espande dal nord Africa e interessa l'Europa centro-occidentale: sul Veneto cielo in prevalenza sereno e aria progressivamente più calda. Temperature superiori alla media del periodo anche di molto nei valori massimi da giovedì.

[www.arpav.veneto.it/previsioni/it/html/index.php](http://www.arpav.veneto.it/previsioni/it/html/index.php)

	mercoledì 21		giovedì 22		venerdì 23	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
<b>Probabilità Precipitazioni</b>	0%	0/20%	0%	0/20%	0%	0/20%
<b>Venti</b>	Deboli regime di brezza		Deboli regime di brezza		Deboli regime di brezza	
<b>Temperatura</b>	Min ↑	Max ↑	Min ↑	Max ↑	Min =	Max =


## Informazioni agroclimatiche e territoriali

### Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



### Indice di fienagione


#### Stazione di Feltre



FATTORI LIMITANTI LA FIENAGIONE	
sabato	nessuno
domenica	nessuno
lunedì	elevata umidità
oggi	elevata umidità
mercoledì	elevata umidità
giovedì	elevata umidità
venerdì	elevata umidità

### Indice di fienagione

#### Stazione di Lamon



FATTORI LIMITANTI LA FIENAGIONE	
sabato	nessuno
domenica	nessuno
lunedì	nessuno
oggi	nessuno
mercoledì	nessuno
giovedì	nessuno
venerdì	elevata umidità

### Dai Servizi Fitosanitari

#### - settore orticolo -

**Patata** Sulle varietà medio tardive/tardive è presente in maniera diffusa l'Alternaria (Alternaria solani) i cui sintomi sono particolarmente evidenti sulle foglie mediane e apicali. Si manifesta con macchie rotondeggianti di 1-2 mm di diametro di colore bruno scuro, che si possono confondere con danni da fitotossicità dei prodotti impiegati. Le macchie si allargano velocemente interessando tutta la foglia che inizialmente ingiallisce per poi disseccarsi. In passato tale alterazione veniva attribuita a una senescenza precoce della pianta, con presenza su varietà geneticamente "vecchie" quali Primura o Liseta, ma con gli anni il problema si è manifestato anche su nuove varietà (Agata, Colombo) che sono risultate particolarmente sensibili. Non sempre i prodotti impiegati per il controllo della Peronospora risultano efficaci anche nei confronti dell'Alternaria, che necessita, sulle varietà più sensibili, di interventi specifici. A tal proposito una deroga territoriale per aumentare il numero dei trattamenti con i prodotti a base di DIFENOCONAZOLO, per coloro che seguono i disciplinari di difesa regionali, è stata recentemente concessa. Presenza di qualche Dorifora ma che rimane sotto soglia d'intervento. Nessuna Batteriosi segnalata.

**Fagiolino** Le temperature elevate di questo periodo hanno favorito infestazioni da Tripide (Franklinella intonsa) sull'attuale ciclo di coltivazione. Il danno è causato dalle punture di nutrizione che provocano sui baccelli deformazioni e macchie necrotiche argentate o rugginose. Intervenire con PIRETROIDI in caso di presenza.

#### - settore cerealicolo: Mais -

#### - settore frutticolo -

#### Pomacee/Drupacee(Pesco)

#### - settore olivicolo -

[www.arpav.veneto.it/upload\\_teolo/agrometeo/bollagr/veneto.html](http://www.arpav.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/bollagr/veneto.html)

## Vigneto Veneto

### Andamento e previsioni produttive

[www.venetoagricoltura.org/upload/Europe%20Direct/Conegliano%2021%20giugno%202017/invito\\_21\\_6\\_17.pdf](http://www.venetoagricoltura.org/upload/Europe%20Direct/Conegliano%2021%20giugno%202017/invito_21_6_17.pdf)

## Bollettino colture erbacee

[www.venetoagricoltura.org/news\\_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60](http://www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60)

### Il proverbio della settimana

Se gh'è neve piova a S.Romualdo, agosto caldo

### La fase lunare

Luna calante



### Il prossimo bollettino

venerdì 23 giugno