

Il tempo previsto nei prossimi giorni


Evoluzione Generale Nei prossimi giorni la caratteristica meteorologica più rilevante è l'ingresso a sud delle Alpi di masse di aria fredda da nord, con condizioni prevalentemente cicloniche; il tempo sarà inizialmente variabile, con modeste precipitazioni nel fine settimana, e calo termico sensibile da domenica, fino a temperature al di sotto delle medie del periodo.

www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php


	sabato 17		domenica 18		lunedì 19	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Probabilità Precipitazioni	40/60%	80/100%	40/60%	20/40%	20/40%	20/40%
Venti	Deboli/Moderati da Est		Deboli/Moderati da Est		Deboli/Moderati da Est	
Temperatura	Min ↓	Max ↓	Min ↓	Max ↓	Min ↓	Max ↓

Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



Dai Servizi Fitosanitari

- settore frutticolo -

Pomacee Fase di rigonfiamento gemme, comparsa di punte verdi su varietà di melo a germogliamento precoce - Pink Lady; fase di apertura gemme del pero. Con la comparsa delle punte verdi è possibile il verificarsi di infezioni di Ticchiolatura, in caso di pioggia, anche leggera. Il trattamento va sempre effettuato in via preventiva, quindi prima della pioggia prevista, utilizzando prodotti di CONTACTO, di preferenza RAMEICI nelle prime fasi (efficaci anche verso i Cancri rameali) e successivamente DITIOCARBAMMATI o altri. Da questo periodo fino a orecchiette di topo si interviene contro la Cocciniglia, utilizzando OLIO MINERALE (che deve essere distanziato di 10 giorni dallo zolfo), PYRIPROXYFEN (facendo attenzione ai dosaggi riportati nei diversi formulati commerciali), BUPROFEZIN (revocato, è ancora possibile l'uso entro il 20 giugno). Si ricorda l'importanza della corretta e completa bagnatura di tutta la pianta; il trattamento va effettuato in condizioni climatiche favorevoli, con giornate asciutte e assenza di vento. In questa fase è consigliato, negli appezzamenti di pero dove lo scorso anno si erano manifestati attacchi di Colpo di fuoco, un attento monitoraggio in modo da completare la pulizia con l'eliminazione delle parti di pianta o delle piante con presenza di Cancri attribuibili alla Batteriosi. INTERVENTI SPECIFICI potrebbero essere richiesti, in qualche appezzamento di pero dove lo scorso anno erano stati segnalati danni da Eriofide vescicoloso. Da orecchiette di topo, su melo, è opportuno iniziare gli interventi con ZOLFO o PRODOTTI SPECIFICI verso l'Oidio negli appezzamenti notoriamente interessati.

Precipitazioni (mm) ultimi giorni

stazione/giorni	15/3
Feltre	15
Lamon	13,8
Valdobbiadene	23

Agrimont 2018

www.agrimont.it/

Bollettino colture erbacee

www.venetoagricoltura.org/argomento/bollettino-culture-erbacee/

Il proverbio della settimana

Da Sant'Isepo, le sisile passa el teto

La fase lunare

Luna calante



Il prossimo bollettino

martedì 20 marzo