

Il tempo previsto nei prossimi giorni


Evoluzione Generale Una depressione presente sul centro Europa in spostamento verso Est, determina sulla regione ancora qualche fase di instabilità nelle ore pomeridiane di martedì e mercoledì. Seguirà un nuovo aumento della pressione con tempo stabile, in prevalenza soleggiato e temperature in ripresa salvo modesta variabilità sabato.

www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php


	mercoledì 26		giovedì 27		venerdì 28	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Probabilità Precipitazioni	0%		20/40%		0%	
Venti	Deboli-Variabili		Deboli-Variabili		Deboli-Variabili	
Temperatura	Min =	Max =	Min ↑	Max ↑	Min ↑	Max ↑

Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



Precipitazioni (mm) ultimi giorni


stazione/giorni	23/7	24/7
Feltre	0	46,8
Lamon	5	59,4
Valdobbiadene	8	22,2

Bollettino colture erbacee

www.venetoagricoltura.org/news_item.php?IDSX=6&SIDSX=120&IDDX=60

Indice di fienagione

Stazione di Feltre




FATTORI LIMITANTI LA FIENAGIONE

sabato	elevata umidità
domenica	elevata umidità
lunedì	pioggia, elevata umidità
oggi	elevata umidità
mercoledì	elevata umidità
giovedì	elevata umidità
venerdì	elevata umidità

Indice di fienagione

Stazione di Lamon



FATTORI LIMITANTI LA FIENAGIONE

sabato	nessuno
domenica	pioggia, elevata umidità
lunedì	pioggia, poco sole, elevata umidità
oggi	elevata umidità
mercoledì	elevata umidità
giovedì	elevata umidità
venerdì	elevata umidità

Dai Servizi Fitosanitari

- settore orticolo -

Asparago Buona la situazione fitosanitaria. Dalla scorsa settimana si osservano infezioni di Ruggine. Iniziare la difesa con prodotti SPECIFICI bagnando accuratamente tutta la vegetazione. Su asparago bianco si segnala la comparsa di Stemphilium. Nessuna presenza di Criocera. **Melone** Al momento non si segnalano sintomi di Peronospora. Intervenire in caso di previsione di piogge o bagnature prolungate. Presenze diffuse di Oidio con necessità di trattamenti specifici. **Pomodoro da industria** L'inizio raccolte è previsto per fine settimana. Peronospora: qualche presenza, in particolare sugli ultimi trapianti, in conseguenza delle piogge di venerdì 14. La difesa deve tener conto dell'epoca di raccolta prevista e delle possibili piogge o bagnature. Qualche limitata presenza di Batteriosi, di Alternaria e di Septoria in zone umide, su impianti irrigati. Per quanto riguarda il Ragnetto rosso, negli impianti in buone condizioni irrigue non sono stati necessari interventi; è da verificare la situazione su impianti medio tardivi, dove non è del tutto esclusa la necessità di un TRATTAMENTO SPECIFICO. Proseguono le catture della Nottua gialla (*Heliothis armigera*) sulle trappole a feromoni. La soglia di intervento è di 2 piante ogni 30 controllate con presenza di uova o larve. Su **Porro** e altre colture orticole si segnalano attacchi di Tripide di difficile contenimento. **Orticole in serra** Le persistenti elevate temperature hanno favorito attacchi diffusi di Ragnetto rosso sulle diverse colture, in particolare pomodoro e melanzana. Su pomodoro occorre fare attenzione alla presenza di Tuta assoluta, che se non tempestivamente contenuta può diventare di difficile contenimento anche con l'applicazione della CONFUSIONE SESSUALE e di INSETTICIDI. Sempre su pomodoro si può avere comparsa di Oidio. Su melanzana occorre verificare la presenza di Miridi, Lygus, ed intervenire per ridurre i danni sui fiori. Sulle cucurbitacee, zucchini e cetriolo, l'Oidio rimane l'avversità principale.

-settore frutticolo(Pomacee)olivicolo-

www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/bollagr/veneto.html

Il proverbio della settimana

Piova estiva, bon pro a chi ariva

La fase lunare

Luna crescente



Il prossimo bollettino

giovedì 27 luglio