

Il tempo previsto nei prossimi giorni

Evoluzione Generale Probabili rovesci e temporali, anche intensi, a partire dalle zone montane dal pomeriggio di venerdì, in estensione alla pianura nella notte tra venerdì e sabato accompagnati da un marcato calo termico. Fino alla mattinata di lunedì permarranno condizioni di instabilità con ancora la possibilità di rovesci e temporali locali. In seguito tempo più stabile e temperatura in ripresa.


www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php

	sabato 21		domenica 22		lunedì 23	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Probabilità Precipitazioni	80/100%		60/80%		20/40%	
Venti	Deboli/Moderati-Variabili		Deboli/Moderati-Variabili		Deboli/Moderati-Variabili	
Temperatura	Min ↓	Max ↓	Min =	Max ↑	Min ↑	Max ↑




Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Indice di fienagione

Stazione di Tambre




Dai Servizi Fitosanitari

- settore viticolo -

Fenologia Negli ambienti di pianura e in media e bassa collina la maggior parte dei vitigni, ad eccezione di quelli tardivi, è ormai in fase di invaiatura (BBCH 83). In alta collina sulle varietà precoci sono stati rilevati i primissimi acini che iniziano a virare di colore. Ad oggi la fenologia della vite manifesta globalmente un certo rallentamento. **Pero-nospora** La situazione non è sostanzialmente variata rispetto alla settimana scorsa. Il pericolo di infezioni si mantiene a un livello di rischio medio: si rilevano ancora macchie d'olio da infezioni secondarie che a seguito degli eventi piovosi continuano a sporulare. Si raccomanda di mantenere la protezione della vegetazione impiegando prodotti RAMEICI con turno di intervento lungo (10-12 giorni) in caso di scarsa presenza della malattia e con turno più breve (7-8 giorni) nelle situazioni nelle quali si rilevano attacchi importanti all'apparato fogliare. Si fa presente che nell'ambito della difesa integrata per il 2018 il limite annuale di 6 kg/ha di RAME metallo è stato innalzato a 9 kg/ha a seguito dell'emanazione in data 12/07/2018 della relativa autorizzazione regionale. Questa indicazione non vale per per l'agricoltura biologica, che è soggetta a specifica normativa. **Oidio** Le condizioni climatiche di questo periodo determinano un elevato rischio epidemico per questa patologia. Ciononostante non si rilevano situazioni particolarmente problematiche a parte pochi casi. Si consiglia di abbinare ZOLFO a dose medio/alta al trattamento RAMEICO; nei casi di attacchi importanti trattare con ZOLFO VENTILATO. **Botrite** Attualmente non sono state osservate infezioni importanti. **Tignoletta / Cocciniglie...**

Indice di fienagione

Stazione di Longarone




FATTORI LIMITANTI LA FIENAGIONE

martedì	nessuno
mercoledì	nessuno
giovedì	nessuno
oggi	pioggia
sabato	pioggia, poco sole, elevata umidità
domenica	pioggia, elevata umidità
lunedì	nessuno

- settore olivicolo/frutticolo -

www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/bollagr/veneto.html

Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



Precipitazioni (mm) ultimi giorni

stazione/giorni	16/7
Col Indes (Tambre)	6,4
Longarone	5,6
Torch	17,4
Vittorio Veneto	4,6

Avversità Atmosferiche

"Segnalazione Danni" Luglio 2018

www.avepa.it/notizia-dettanillo/-/asset_publisher/HtVqO4cXrd5/content/id/2550748

Bollettino colture erbacee

www.venetoagricoltura.org/argomento/bollettino-culture-erbacee/

Il proverbio della settimana

Chi vol un bel rapujo, lo semini in Lujo

La fase lunare

Luna crescente



Il prossimo bollettino

martedì 24 luglio