

# **Campagna di Monitoraggio della Qualità dell'Aria Comune di Cimadolmo**

**Via Lovadina**



**Periodo di attuazione:**

**12 Febbraio – 18 Maggio 2021**

**RELAZIONE TECNICA**



**Agenzia Regionale per la Prevenzione  
e Protezione Ambientale del Veneto**



**REGIONE DEL VENETO**

## **ARPAV**

**Commissario Straordinario**

*Luca Marchesi*

**Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente**

*Rodolfo Bassan*

**Progetto e realizzazione**

**U.O. Monitoraggio Aria**

*Giovanna Marson*

*Claudia Iuzzolino, Alessandro Mattiello*

**Con la collaborazione di:**

**Dipartimento Regionale Sicurezza del territorio**

**U.O. Meteorologia e Climatologia**

*Alberto Bonini*

**Dipartimento Regionale Laboratori**

*Alessandro Benassi*

È consentita la riproduzione di testi, tabelle, grafici ed in genere del contenuto del presente rapporto esclusivamente con la citazione della fonte.

**INDICE**

1.	Introduzione e obiettivi specifici della campagna .....	4
2.	Caratterizzazione del sito e tempistiche di realizzazione .....	4
3.	Contestualizzazione meteo climatica dell’area .....	5
4.	Inquinanti monitorati e normativa di riferimento .....	6
5.	Informazioni sulla strumentazione e sulle analisi .....	8
6.	Efficienza di campionamento .....	8
7.	Analisi dei dati rilevati .....	9
	Polveri atmosferiche inalabili (PM10).....	9
	Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni (BTEX).....	10
	Idrocarburi Policiclici Aromatici .....	10
8.	Conclusioni .....	11
	ALLEGATO.....	13
	GLOSSARIO.....	15

## 1. Introduzione e obiettivi specifici della campagna

La qualità dell’aria nel comune di Cimadolmo è stata valutata tramite una campagna di monitoraggio eseguita con campionario portatile posizionato in Via Lovadina.

La finalità del monitoraggio è quello di acquisire dei dati sulla qualità dell’aria in una zona di fondo urbano (background urbano, in sigla BU) del comune di Cimadolmo.

Con l’obiettivo di proporre un confronto con una realtà monitorata in continuo verrà fornita per ogni inquinante l’indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso la stazione fissa di Treviso – via Lancieri di Novara.

## 2. Caratterizzazione del sito e tempistiche di realizzazione

La campagna di monitoraggio della qualità dell’aria con campionario portatile si è svolta dal 12/02/2021 al 18/05/2021 in un periodo invernale ed uno estivo per garantire una maggiore rappresentatività delle informazioni acquisite. Di seguito s’intende per “campagna invernale” la campagna eseguita nel periodo compreso tra il 12/02/2021 e il 31/03/2021, e per “campagna estiva” quella eseguita dal 1/04/2021 al 18/05/2021.

Si ricorda che il 01/01/2021 è entrata in vigore la nuova zonizzazione regionale approvata con DGR n. 1855/2021 che sostituisce la precedente approvata con DGR n. 2130/2012. Il comune di Cimadolmo ricade attualmente nella zona “IT0522 Pianura” ai sensi della nuova zonizzazione rappresentata in Figura 1 e come meglio specificato nell’Allegato C del DGR n. 1855/2021.

In Figura 2 è indicata l’ubicazione del punto sottoposto a monitoraggio avente le seguenti coordinate GBO: x= 1761421 y= 5076215.




Figura 1. Zonizzazione del territorio regionale approvata con DGR n. 1855/2021




Figura 2. Localizzazione geografica del campionatore portatile a Cimadolmo

### 3. Contestualizzazione meteo climatica dell’area


Di seguito viene descritta, a cura dell’Unità Organizzativa Meteorologia e Climatologia di ARPAV, la situazione meteorologica verificatasi durante la campagna di monitoraggio.

Le Figure 3 e 4 riportano per ciascuna campagna di monitoraggio l’andamento giornaliero della precipitazione, dell’intensità del vento medio a 5 m e della temperatura media registrati nella stazione meteo ARPAV di Vazzola, che dista meno di 5 km dal sito di svolgimento della campagna di misura.

L’analisi delle condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti nel corso delle due campagne evidenzia che, nel corso della campagna invernale, è molto alta la percentuale delle condizioni poco dispersive (più del 90% delle giornate); durante la campagna estiva, pur essendo prevalenti le condizioni poco dispersive, la loro frequenza scende fino a circa il 60%, grazie soprattutto ad un più alto numero di giorni piovosi. Nel corso della campagna estiva, inoltre, le condizioni favorevoli alla formazione di ozono (considerate nei termini di temperatura massima giornaliera) risultano del tutto assenti.



**Figura 3.** andamento delle precipitazioni, intensità del vento e temperatura media giornaliera rilevati presso la stazione di Vazzola durante la campagna invernale



**Figura 4.** andamento delle precipitazioni, intensità del vento e temperatura media giornaliera rilevati presso la stazione di Vazzola durante la campagna estiva

#### 4. Inquinanti monitorati e normativa di riferimento

I dati del monitoraggio sono riferiti agli inquinanti di seguito elencati:

Polveri atmosferiche inalabili (PM10);  
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare il Benzo(a)pirene (B(a)p);  
Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni (BTEX).

Il campionatore portatile è costituito da strumentazione sequenziale per la determinazione gravimetrica delle polveri inalabili PM10. Sui campioni prelevati sono state effettuate le analisi in laboratorio degli idrocarburi policiclici aromatici IPA (in particolare quelli considerati di rilevanza tossicologica dal D.Lgs 155/10 ovvero Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(ghi)perilene, Crisene, Dibenz(a,h)antracene, Indeno(123-cd)pirene).

Inoltre sono stati effettuati dei rilevamenti settimanali di BTEX utilizzando i campionatori passivi Radiello®.

Si ricorda che il campionamento passivo non è considerato dalla vigente normativa tra i metodi ufficiali di riferimento per la valutazione della qualità dell’aria e i dati rilevati durante la campagna

non sono direttamente confrontabili con il limite di legge ma forniscono comunque un'indicazione del valore medio annuo.

Nelle Tabelle seguenti si riportano, per ciascun inquinante, i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 155/2010, suddivisi in limiti di legge a mediazione di breve periodo, correlati all'esposizione acuta della popolazione e limiti di legge a mediazione di lungo periodo, correlati all'esposizione cronica della popolazione. In Tabella 3 sono indicati i limiti di legge stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 per la protezione degli ecosistemi.

**Tabella 1 - Limiti di legge a mediazione di breve periodo**

Inquinante	Tipologia	Valore
SO <sub>2</sub>	Soglia di allarme (*)	500 µg/m <sup>3</sup>
	Limite orario da non superare più di 24 volte per anno civile	350 µg/m <sup>3</sup>
	Limite di 24 h da non superare più di 3 volte per anno civile	125 µg/m <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	Soglia di allarme (*)	400 µg/m <sup>3</sup>
	Limite orario da non superare più di 18 volte per anno civile	200 µg/m <sup>3</sup>
PM10	Limite di 24 h da non superare più di 35 volte per anno civile	50 µg/m <sup>3</sup>
CO	Massimo giornaliero della media mobile di 8 h	10 mg/m <sup>3</sup>
O <sub>3</sub>	Soglia di informazione (Media 1 h)	180 µg/m <sup>3</sup>
	Soglia di allarme (Media 1 h)	240 µg/m <sup>3</sup>
	Valore obiettivo per la protezione della salute umana da non superare per più di 25 giorni all'anno come media su 3 anni (altrimenti su 1 anno) Media su 8 h massima giornaliera	120 µg/m <sup>3</sup>
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana Media su 8 h massima giornaliera	120 µg/m <sup>3</sup>

(\*) misurato per 3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell'aria in un'area di almeno 100 Km<sup>2</sup>, oppure in un'intera zona o agglomerato nel caso siano meno estesi.

**Tabella 2- Limiti di legge a mediazione di lungo periodo**

Inquinante	Tipologia	Valore
NO <sub>2</sub>	Valore limite annuale	40 µg/m <sup>3</sup>
PM10	Valore limite annuale	40 µg/m <sup>3</sup>
PM2.5	Valore limite annuale	25 µg/m <sup>3</sup>
Piombo	Valore limite annuale	0.5 µg/m <sup>3</sup>
Arsenico	Valore obiettivo (media su anno civile)	6.0 ng/m <sup>3</sup>
Cadmio	Valore obiettivo (media su anno civile)	5.0 ng/m <sup>3</sup>
Nichel	Valore obiettivo (media su anno civile)	20.0 ng/m <sup>3</sup>
Benzene	Valore limite annuale	5.0 µg/m <sup>3</sup>
Benzo(a)pirene	Valore obiettivo (media su anno civile)	1.0 ng/m <sup>3</sup>

**Tabella 3 – Limiti di legge per la protezione degli ecosistemi.**

Inquinante	Tipologia	Valore
SO <sub>2</sub>	Livello critico per la protezione della vegetazione Anno civile e inverno (01/10 – 31/03)	20 µg/m <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	Livello critico per la protezione della vegetazione Anno civile	30 µg/m <sup>3</sup>
O <sub>3</sub>	Valore obiettivo per la protezione della vegetazione AOT40 su medie di 1 h da maggio a luglio Da calcolare come media su 5 anni (altrimenti su 3 anni)	18000 µg/m <sup>3</sup> h
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione AOT40 su medie di 1 h da maggio a luglio	6000 µg/m <sup>3</sup> h

## 5. Informazioni sulla strumentazione e sulle analisi

Il campionamento del particolato inalabile PM10 (diametro aerodinamico inferiore a 10 µm) è stato realizzato con una linea di prelievo sequenziale che utilizza filtri da 47 mm di diametro e cicli di prelievo di 24 ore. Detti campionamenti sono stati condotti con l'utilizzo di apparecchiature conformi alle specifiche tecniche dettate dal D.Lgs. 155/2010 (il volume campionato si riferisce alle condizioni ambiente in termini di temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni).

Le determinazioni analitiche degli idrocarburi policiclici aromatici IPA (con riferimento al benzo(a)pirene) e del PM10 sono state effettuate al termine del ciclo di campionamento sui filtri esposti in quarzo, rispettivamente mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) "metodo UNI EN 15549:2008" e determinazione gravimetrica "metodo UNI EN 12341:2014".

La determinazione gravimetrica del PM10 è stata effettuata su tutti i filtri campionati, mentre le determinazioni del benzo(a)pirene sono state eseguite seguendo frequenze utili a rispettare l'adeguamento agli obiettivi di qualità dei dati previsti dal D.Lgs. 155/2010 (Allegato I).

Il campionamento del Benzene è stato effettuato con rilevamenti settimanali utilizzando i campionatori passivi Radiello® e l'analisi è stata effettuata tramite desorbimento termico e gascromatografia capillare.

Con riferimento ai risultati riportati di seguito si precisa che la rappresentazione dei valori inferiori al limite di quantificazione segue una distribuzione statistica di tipo gaussiano normale in cui la metà del limite di quantificazione rappresenta il valore più probabile. Si è scelto pertanto di attribuire tale valore ai dati inferiori al limite di quantificazione, diverso a seconda dello strumento impiegato o della metodologia adottata.

Inoltre, ai fini delle elaborazioni e per la valutazione della conformità al valore limite si utilizzano le "Regole di accettazione e rifiuto semplici", ossia le regole più elementari di trattamento dei dati, corrispondenti alla considerazione delle singole misure prive di incertezza e del valore medio come numero esatto. ("Valutazione della conformità in presenza dell'incertezza di misura". di R.Mufato e G. Sartori nel Bollettino degli esperti ambientali. Incertezza delle misure e certezza del diritto/anno 62, 2011 2-3).

## 6. Efficienza di campionamento

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di qualità di cui all'Allegato I del D.Lgs. 155/2010 e l'accuratezza delle misurazioni, la normativa stabilisce dei criteri in materia di incertezza dei metodi di valutazione, di periodo minimo di copertura e di raccolta minima dei dati.

I requisiti relativi alla raccolta minima dei dati ed al periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica od alla manutenzione ordinaria della strumentazione.

Per le misurazioni indicative il periodo minimo di copertura deve essere del 14% nell'arco dell'intero anno civile (pari a 52 giorni/anno), con una resa del 90%; in particolare le misurazioni possono essere uniformemente distribuite nell'arco dell'anno civile o, in alternativa, effettuate per otto settimane equamente distribuite nell'arco dell'anno.

Per le misurazioni indicative è comunque possibile applicare un periodo di copertura più basso, ma non inferiore al 6%, purché si dimostri che l'incertezza estesa nel calcolo della media annuale sia rispettata.

Quanto sopraesposto è illustrato anche nella Tabella 4.



Tabella 4 Efficienza di campionamento e copertura di raccolta dei dati riferiti nell'arco dell'intero anno civile

		INTERA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO		VALORI MINIMI (Allegato I - DLgs 155/10)
PM10	COPERTURA %	22		14
	EFFICIENZA %	99		90
IPA nel PM10	COPERTURA %	17		14
	EFFICIENZA %	100		90
Benzene	COPERTURA %	24	Il metodo di campionamento utilizzato non è previsto dal DLgs 155/2010	14
	EFFICIENZA %	100		90

## 7. Analisi dei dati rilevati

Sono stati campionati ed analizzati 95 filtri per PM10, di cui 47 prelevati durante la campagna invernale e 48 durante quella estiva, e su 63 sono stati analizzati gli IPA. Sono stati inoltre raccolti 13 campioni per la determinazione di Benzene.

### Polveri atmosferiche inalabili (PM10)

Durante il monitoraggio la concentrazione di polveri PM10 ha superato il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana, pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , da non superare per più di 35 volte per anno civile (Allegato – Grafico 1) per 15 giorni su 47 di misura (32%) durante la campagna invernale e quindi per un totale di 15 giorni su 95 di misura (16%).

Nello stesso periodo di monitoraggio le concentrazioni giornaliere di PM10 misurate presso la stazione fissa di fondo urbano della Rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell'aria, a Treviso, sono risultate superiori a tale valore limite per 14 giorni su 96 di misura (15%). La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a Cimadolmo è risultata pari a  $43 \mu\text{g}/\text{m}^3$  nella campagna invernale e a  $16 \mu\text{g}/\text{m}^3$  nella campagna estiva. La media dell'intera campagna è risultata pari a  $29 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Presso la stazione fissa di Treviso la media delle concentrazioni giornaliere di PM10 durante la campagna invernale è risultata pari a  $42 \mu\text{g}/\text{m}^3$  mentre la media durante la campagna estiva è risultata pari a  $14 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . La media dell'intera campagna è risultata pari a  $28 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Tabella 5 – Confronto delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a Cimadolmo con quelle misurate a Treviso

	PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
	Cimadolmo	Treviso
<b>MEDIA Campagna invernale</b>	43	42
n. superamenti	15	14
n. dati	47	48
<b>MEDIA Campagna estivo</b>	16	14
n. superamenti	0	0
n. dati	48	47
<b>MEDIA totale</b>	29	28
n. superamenti	15	14
n. dati	95	96
% superamenti	16	15

Allo scopo di valutare il rispetto dei valori limite di legge previsti dal D.Lgs. 155/10 per il parametro PM10, ovvero il rispetto del Valore Limite sulle 24 ore di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  e del Valore Limite annuale di  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , nei siti presso i quali si realizza una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria di lunghezza limitata (misurazioni indicative), è stata utilizzata una metodologia di calcolo elaborata dall'U.O. Qualità dell'Aria di ARPAV.

Tale metodologia prevede di confrontare il “sito sporadico” (campagna di monitoraggio) con una stazione fissa, considerata rappresentativa per vicinanza o per stessa tipologia di emissioni e di condizioni meteorologiche. Sulla base di considerazioni statistiche è possibile così stimare, per il sito sporadico, il valore medio annuale e il 90° percentile delle concentrazioni di PM10; quest’ultimo parametro statistico è rilevante in quanto corrisponde, in una distribuzione di 365 valori, al 36° valore massimo. Poiché per il PM10 sono consentiti 35 superamenti del valore limite giornaliero di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , in una serie annuale di 365 valori giornalieri, il rispetto del valore limite è garantito se il 36° valore in ordine di grandezza è minore di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Per quanto detto il sito di Cimadolmo è stato confrontato con la stazione fissa di riferimento di Treviso. La metodologia di calcolo stima per il sito sporadico di Cimadolmo il valore medio annuale di 29  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (inferiore al valore limite annuale di 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) ed il 90° percentile di 52  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (superiore al valore limite giornaliero di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

### Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni (BTEX)

La media di periodo delle concentrazioni settimanali di Benzene misurate a Cimadolmo è risultata pari a 2.1  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nella campagna invernale e pari a 1.1  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nella campagna estiva. La media complessiva dei due periodi, 1.5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , è superiore a quella rilevata con metodo automatico presso la stazione fissa di Treviso, pari a 1.0  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . In entrambi i siti i valori risultano ampiamente al di sotto del limite annuale previsto dal D.Lgs. 155/2010 pari a 5.0  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Si ricorda che il metodo di campionamento passivo utilizzato durante le campagne di monitoraggio non è considerato dalla vigente normativa tra i metodi ufficiali di riferimento per la valutazione della qualità dell’aria e i dati rilevati non sono direttamente confrontabili con il limite di legge ma forniscono comunque un’indicazione del valore medio annuo.

In Allegato – Grafico 2 sono riportate le concentrazioni medie settimanali di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni rilevate a Cimadolmo. La Tabella 6 riporta il confronto dei medesimi inquinanti rilevati a Treviso.

**Tabella 6 –** Concentrazioni di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xilene misurate a Cimadolmo e Treviso

Concentrazioni medie del periodo ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Cimadolmo			Treviso		
	Media Campagna invernale	Media Campagna estiva	Media totale	Media Campagna invernale	Media Campagna estiva	Media totale
Benzene	2.1	1.1	1.5	1.6	0.5	1.0
Toluene	3.3	1.8	2.5	4.0	1.8	2.9
Etilbenzene	1.1	0.9	1.0	0.6	0.4	0.5
Xileni	4.0	3.1	3.5	2.8	1.3	2.1

### Idrocarburi Policiclici Aromatici

Per il sito di Cimadolmo sono stati analizzati 63 campioni di PM10, di cui 31 prelevati durante la campagna invernale e 32 durante quella estiva, mentre per la stazione di Treviso ne sono stati analizzati 29 in totale.

La media di periodo delle concentrazioni giornaliere di benzo(a)pirene misurate a Cimadolmo è risultata 1.4  $\text{ng}/\text{m}^3$  nella campagna invernale e 0.2  $\text{ng}/\text{m}^3$  in quella estiva. La media complessiva dei due periodi è risultata di 0.8  $\text{ng}/\text{m}^3$ . Si riporta il riferimento della stazione fissa di Treviso, dove la media complessiva dei due periodi è risultata pari a 0.9  $\text{ng}/\text{m}^3$ , quindi confrontabile a quella rilevata presso il sito di Cimadolmo.

Nel seguito vengono riportati anche i risultati ottenuti per alcuni IPA analizzati, in quanto considerati di rilevanza tossicologica dal D.Lgs 155/10, e per i quali la normativa non prevede un valore di riferimento (Allegato – Grafico 3).

**Tabella 7** – Confronto delle concentrazioni medie di IPA e in particolare di benzo(a)pirene misurate a Cimadolmo con quelle misurate a Treviso.

Concentrazioni medie del periodo (ng/m <sup>3</sup> )	Cimadolmo			Treviso		
	Media campagna invernale	Media campagna estiva	Media totale	Media campagna invernale	Media campagna estiva	Media totale
Benzo(a)antracene	0.9	0.1	0.5	0.9	0.1	0.5
Benzo(a)Pirene	1.4	0.2	0.8	1.5	0.2	0.9
Benzo(b)fluorantene	1.7	0.4	1.0	2.1	0.3	1.3
Benzo(ghi)perilene	1.4	0.2	0.8	1.3	0.2	0.8
Benzo(k)fluorantene	1.4	0.1	0.7	0.8	0.1	0.5
Crisene	0.9	0.2	0.5	0.9	0.1	0.6
Dibenzo(ah)antracene	0.1	0.02	0.07	0.08	0.02	0.05
Indeno(123-cd)pirene	1.7	0.3	1.0	1.7	0.3	1.1

Si ricorda che, per ulteriori informazioni sulla qualità dell’aria del territorio provinciale di Treviso, sul sito internet di ARPAV ([www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)) sono attualmente consultabili in tempo reale le concentrazioni di polveri inalabili PM10 determinate presso le stazioni fisse della rete ARPAV dislocate nel territorio Provinciale di Treviso, nonché di molte altre stazioni a livello regionale.

## 8. Conclusioni

La qualità dell’aria nel comune di Cimadolmo è stata valutata in seguito ad una campagna di monitoraggio eseguita mediante campionario portatile posizionato in Via Lovadina svolta dal 12/02/2021 al 18/05/2021 in un periodo invernale ed in uno estivo per garantire una maggiore rappresentatività delle informazioni acquisite. S’intende per “campagna invernale” la campagna eseguita nel periodo compreso tra il 12/02/2021 e il 31/03/2021, e per “campagna estiva” quella eseguita dal 1/04/2021 al 18/05/2021.

Per la descrizione della situazione meteorologica nel periodo di svolgimento della campagna sono stati utilizzati i dati della stazione meteorologica della rete ARPAV di Vazzola. Dalla valutazione dei dati è emerso che le condizioni meteorologiche verificatesi durante la campagna invernale sono state poco dispersive mentre, al contrario, durante la campagna estiva si sono osservati numerosi eventi piovosi. Inoltre durante la campagna estiva le condizioni favorevoli alla formazione di ozono (considerate nei termini di temperatura massima giornaliera) sono risultate del tutto assenti.

Il monitoraggio ha permesso di disporre di campioni giornalieri del parametro inquinante PM10; su alcuni campioni di PM10 sono state eseguite le analisi di IPA. Sono stati eseguiti inoltre campionamenti settimanali di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni.

Con l’obiettivo di proporre un confronto con una realtà urbana monitorata in continuo, è stata fornita, per gli inquinanti monitorati, l’indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso la stazione fissa della Rete ARPAV di Treviso – via Lancieri di Novara.

Per quanto riguarda l’inquinante **PM10** si sono osservati durante il periodo invernale alcuni superamenti del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> previsto dal D.Lgs. 155/2010 da non superare per più di 35 volte l’anno. Allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di legge previsti dal D.Lgs. 155/2010 per il PM10, è stata utilizzata una metodologia di calcolo elaborata dall’U.O. Qualità dell’Aria di ARPAV. L’applicazione della metodologia di stima ha evidenziato il rispetto del Valore Limite annuale di 40 µg/m<sup>3</sup> e il rischio di superamento del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> nel caso venga considerata come stazione di riferimento quella di Treviso.

Le concentrazioni di **Benzene** determinate a Cimadolmo sono risultate ampiamente al di sotto del limite previsto dal D.Lgs. 155/2010 pari a 5.0 µg/m<sup>3</sup>. Si ricorda tuttavia che i valori di concentrazione di benzene rilevati durante le campagne di monitoraggio forniscono un’indicazione del valore medio annuo anche se non sono direttamente confrontabili con il limite di legge.

La determinazione di IPA sui PM10, ed in particolare di **Benzo(a)Pirene**, ha evidenziato la presenza di concentrazioni confrontabili a quelle determinate nello stesso periodo presso la stazione fissa di Treviso. Si ricorda che per il B(a)P l’Obiettivo di Qualità annuale è di 1.0 ng/m<sup>3</sup>


prefissato dal D.Lgs. 155/2010; tale valore è stato superato presso la centralina di Treviso ogni anno dal 2009 al 2013 e dal 2015 al 2020 mentre è stato rispettato nell'anno 2014 grazie alle particolari condizioni meteorologiche che sono state particolarmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Il Responsabile dell'istruttoria  
*Dr.ssa Claudia Iuzzolino*


Il Responsabile del procedimento  
*Dr.ssa Giovanna Marson*

**ALLEGATO**


**Grafico 1 – Concentrazione Giornaliera di PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).**  
*Campagna invernale*




*Campagna estiva*



**Grafico 2 - Valori settimanali di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni rilevati a Cimadolmo**



**Grafico 3 - Confronto tra i valori di IPA determinati su campioni diPM10.**



## **GLOSSARIO**

### **Agglomerato:**

zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente: 1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure 2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km<sup>2</sup> superiore a 3.000 abitanti.

### **AOT40 (Accumulated exposure Over Threshold of 40 ppb)**

espresso in ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )\*h. Rappresenta la differenza tra le concentrazioni orarie di ozono superiori a 40 ppb (circa  $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) e 40 ppb, in un dato periodo di tempo, utilizzando solo valori orari rilevati, ogni giorno, tra le 8:00 e le 20:00 (ora dell'Europa centrale).

### **Background (stazione di)**

Punto di campionamento ubicato in posizione tale che il livello di inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.) ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito

### **Fattore di emissione**

Valore medio (su base temporale e spaziale) che lega la quantità di inquinante rilasciato in atmosfera con l'attività responsabile dell'emissione (ad es. kg di inquinante emesso per tonnellata di prodotto o di combustibile utilizzato).

### **Industriale (stazione)**

Punto di campionamento ubicato in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o da zone industriali limitrofe

### **Inquinante**

Qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso.

### **Inventario delle emissioni**

Serie organizzata di dati, realizzata secondo procedure e metodologie verificabili e aggiornabili, relativi alle quantità di inquinanti introdotti nell'atmosfera da sorgenti naturali e/o da attività antropiche. Le quantità di inquinanti emesse dalle diverse sorgenti della zona in esame si possono ottenere tramite misure dirette, campionarie o continue o tramite stima.

### **IQA (Indice di Qualità dell'Aria)**

E' una grandezza che permette di rappresentare in maniera sintetica lo stato di qualità dell'aria.

### **Margine di tolleranza:**

Percentuale del valore limite entro la quale è ammesso il superamento del valore limite alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 155/2010.

### **Media mobile (su 8 ore)**

La media mobile su 8 ore è una media calcolata sui dati orari scegliendo un intervallo di 8 ore; ogni ora l'intervallo viene aggiornato e, di conseguenza, ricalcolata la media. Ogni media su 8 ore così calcolata è assegnata al giorno nel quale l'intervallo di 8 ore si conclude. Ad esempio, il primo periodo di 8 ore per ogni singolo giorno sarà quello compreso tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l'ultimo periodo di 8 ore per ogni giorno sarà quello compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso. La media mobile su 8 ore massima

giornaliera corrisponde alla media mobile su 8 ore che, nell'arco della giornata, ha assunto il valore più elevato.

**Obiettivo a lungo termine**

Livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di assicurare un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente

**Percentile**

I percentili o quantili, sono parametri di posizione che dividono una serie di dati in gruppi non uguali, ad esempio un quantile 0.98 (o 98° percentile), è quel valore che divide la serie di dati in due parti, nella quale una delle due ha il 98% dei valori inferiore al dato quantile. La mediana rappresenta il 50° percentile. I percentili si calcolano come la mediana, ordinando i dati in senso crescente e interpolando il valore relativo al quantile ricercato.

**Soglia di allarme**

livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati.

**Soglia di informazione**

livello di ozono oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste.

**Sorgente (inquinante)**

Fonte da cui ha origine l'emissione della sostanza inquinante. Può essere naturale (acque, sole, foreste) o antropica (infrastrutture e servizi). A seconda della quantità di inquinante emessa e delle modalità di emissione una sorgente può essere puntuale, diffusa, lineare.

**Traffico (stazione di)**

Punto di campionamento rappresentativo dei livelli d'inquinamento massimi caratteristici dell'area monitorata influenzato prevalentemente da emissioni da traffico provenienti dalle strade limitrofe.

**Valore limite**

Livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso.

**Valore obiettivo**

Concentrazione nell'aria ambiente stabilita al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, il cui raggiungimento, entro un dato termine, deve essere perseguito mediante tutte le misure che non comportino costi sproporzionati.

**Zonizzazione**

Suddivisione del territorio in aree a diversa criticità relativamente all'inquinamento atmosferico, realizzata in conformità al D.Lgs. 155/2010.



**Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente**

U.O. Qualità dell'aria  
Sede di Treviso  
Via Santa Barbara, 5/A  
31100 Treviso  
Tel. +39 0422 558 541/2  
Fax +39 0422 558 516  
E-mail: [orar@arpa.veneto.it](mailto:orar@arpa.veneto.it)  
[DRQA@pec.arpav.it](mailto:DRQA@pec.arpav.it)

Luglio 2021



**ARPAV**

Agenzia Regionale  
per la Prevenzione e  
Protezione Ambientale  
del Veneto

Direzione Generale  
Via Ospedale Civile, 24  
35137 Padova

Italy

tel. +39 049 82 39 301

fax. +39 049 66 09 66

e-mail: [urp@arpa.veneto.it](mailto:urp@arpa.veneto.it)

e-mail certificata: [protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it)

[www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)