



Agenzia Regionale per la Prevenzione  
e Protezione Ambientale del Veneto

---

## IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLA PROVINCIA DI TREVISO



*Comune di Paderno del Grappa*

Periodi di indagine:

04 Agosto – 09 Settembre 2009

03 Novembre – 13 Dicembre 2009

Realizzato a cura di  
**A.R.P.A.V.**  
**Dipartimento Provinciale di Treviso**  
Ing. L. Tomiato (direttore)

**Servizio Sistemi Ambientali**  
Dr.ssa M. Rosa (dirigente responsabile)

**Ufficio Reti Monitoraggio**  
Dr.ssa C. Iuzzolino  
Dr. F. Steffan  
P.i. G. Pick

**Dipartimento Regionale Laboratori di Arpav**

Redatto da:  
Dr.ssa M. Rosa, Dr.ssa C. Iuzzolino,  
Dr. F. Steffan



**ARPAV**  
Agenzia Regionale per la Prevenzione e  
Protezione Ambientale del Veneto

**Direzione Generale**  
Via Matteotti, 27  
35131 Padova  
Tel. +39 049 82 39301  
Fax. +39 049 66 0966  
E-mail [urp@arpa.veneto.it](mailto:urp@arpa.veneto.it)  
[www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)

**Dipartimento di Treviso**  
**Servizio Sistemi Ambientali**  
Via Santa Barbara , 5/A  
31100 Treviso  
Tel. +39 0422 558 541/2  
Fax +39 0422 558 516  
E-mail: [daptv@arpa.veneto.it](mailto:daptv@arpa.veneto.it)

Luglio 2010

Introduzione .....	2
Riferimenti legislativi.....	3
Risultati delle campagne di monitoraggio.....	5
<b>Monossido di carbonio (CO)</b> .....	<b>5</b>
<b>Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)</b> .....	<b>6</b>
<b>Ozono (O<sub>3</sub>)</b> .....	<b>8</b>
<b>Biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>)</b> .....	<b>9</b>
<b>Polveri inalabili (PM10)</b> .....	<b>11</b>
<b>Composti organici volatili (COV)</b> .....	<b>12</b>
<b>Parametri meteorologici</b> .....	<b>14</b>
La caratterizzazione chimica del particolato .....	16
<b>Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)</b> .....	<b>16</b>
<b>Metalli</b> .....	<b>19</b>
Caratterizzazione dell'area per il parametro PM10.....	19
Conclusioni.....	22

## INTRODUZIONE

La qualità dell'aria nel comune di Paderno del Grappa è stata valutata tramite due campagne di monitoraggio eseguite con stazione rilocabile posizionata nei pressi del municipio allo scopo di disporre di dati sufficienti per proporre un eventuale aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA). Tale scelta è stata valutata in base a quanto riportato al paragrafo 3.3.6 del documento del CTN\_ACE dal titolo "Linea Guida al Monitoraggio e all'analisi di microinquinanti in campo chimico-fisico" dove viene previsto che:

*“Nel caso specifico di indagini di lungo periodo i rilievi devono essere svolti almeno in due periodi, tipicamente freddo e caldo, caratterizzati da una diversa prevalenza delle condizioni di rimescolamento atmosferico”.*

Nella presente relazione vengono riassunti i dati raccolti durante le due campagne eseguite nel semestre caldo (dal 04 agosto al 09 settembre 2009) e nel semestre freddo (dal 03 novembre al 13 dicembre 2009).

Si premette che i limiti di concentrazione in aria per gli inquinanti previsti dalla normativa si riferiscono principalmente allo stato di qualità dell'aria monitorato con stazioni fisse rispondenti a precisi criteri di posizionamento e numero minimo di dati raccolti. Nel presente caso la valutazione è riferita a un monitoraggio di breve periodo effettuato con stazione rilocabile che non garantisce le stesse condizioni di rappresentatività temporale (numero di campioni raccolti) previste dalla normativa vigente per le stazioni di tipo fisso.

Per quanto detto, la valutazione del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa per i dati ambientali rilevati a Paderno del Grappa deve essere considerata, in particolare per i parametri a lungo termine, con valore indicativo.

Con l'obiettivo di proporre un confronto con una realtà monitorata in continuo verrà fornita per ogni inquinante l'indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso le stazioni fisse di Conegliano e Treviso.

I dati di PM10 rilevati durante le campagne sono stati utilizzati per valutare la caratterizzazione dell'area comunale prevista secondo la zonizzazione regionale approvata con DGR 3195 del 17 ottobre 2006. A tale scopo è stato utilizzato una metodologia di calcolo elaborata dall'Osservatorio Regionale Aria di ARPAV.

La seguente immagine riporta la stazione rilocabile posizionata nel comune di Paderno del Grappa, sito di background urbano.



**Foto 1:** Stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa

## **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Il quadro normativo di base cui far riferimento per le attività di monitoraggio ed una corretta gestione della qualità dell'aria comprende le norme sotto elencate:

- D.P.C.M. n. 30 del 28/03/1983: Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno.
- D.Lgs. n. 351 del 04/08/1999: Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.
- D.M. n. 60 del 02/04/2002: Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.
- D.M. n. 261 del 01/10/2002: Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
- D.Lgs. n. 183 del 21/05/2004: Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.

- D.Lgs. n. 152 del 03/08/2007: Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

Viene di seguito schematizzato nella Tabella 1 l'elenco dei valori limite suddivisi per inquinante.

Inquinante	Tipo limite	Parametro statistico	Valore	Riferimento legislativo
<b>SO<sub>2</sub></b>	Valore limite per la protezione degli ecosistemi	Media annuale e media invernale (01/10-31/03)	<b>20</b> µg/m <sup>3</sup>	D.M. 60/02
	Soglia di allarme	Superamento per 3 h consecutive del valore soglia	<b>500</b> µg/m <sup>3</sup>	
	Valore limite orario per la protezione della salute umana da non superare più di 24 volte per anno civile	Media 1 h	<b>350</b> µg/m <sup>3</sup>	
	Valore limite orario per la protezione della salute umana da non superare più di 3 volte per anno civile	Media 24 h	<b>125</b> µg/m <sup>3</sup>	
<b>NO<sub>x</sub></b>	Valore limite per la protezione della vegetazione	Media annuale	<b>30</b> µg/m <sup>3</sup> h	D.M. 60/02
<b>NO<sub>2</sub></b>	Soglia di allarme	Superamento per 3 h consecutive del valore soglia	<b>400</b> µg/m <sup>3</sup>	D.M. 60/02
	Valore limite orario per la protezione della salute umana da non superare più di 18 volte per anno civile	Media 1 h	<b>210</b> µg/m <sup>3</sup> (2009) <b>200</b> µg/m <sup>3</sup> (2010)	
	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Media annuale	<b>42</b> µg/m <sup>3</sup> (2009) <b>40</b> µg/m <sup>3</sup> (2010)	
	Valore limite annuale	98° percentile delle concentrazioni orarie	<b>200</b> µg/m <sup>3</sup>	D.P.C.M. 28/03/83 in vigore fine al 31/12/2009
<b>PM<sub>10</sub></b>	Valore limite di 24 h per la protezione della salute umana da non superare più di 35 volte per anno civile	Media 24 h	<b>50</b> µg/m <sup>3</sup>	D.M. 60/02
	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Media annuale	<b>40</b> µg/m <sup>3</sup>	
<b>CO</b>	Valore limite per la protezione della salute umana	Massima giornaliera di 24 medie mobili su 8 ore	<b>10</b> mg/m <sup>3</sup>	D.M. 60/02
<b>Piombo</b>	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Media annuale	<b>0,5</b> mg/m <sup>3</sup>	D.M. 60/02
<b>Benzene</b>	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Media annuale	<b>6</b> µg/m <sup>3</sup> (2009) <b>5</b> µg/m <sup>3</sup> (2010)	D.M. 60/02
<b>O<sub>3</sub></b>	Soglia di informazione	Superamento del valore orario	<b>180</b> µg/m <sup>3</sup>	D.Lgs. 183/04
	Soglia di allarme	Superamento del valore orario	<b>240</b> µg/m <sup>3</sup>	
	Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana	Massima giornaliera di 24 medie mobili su 8 ore	<b>120</b> µg/m <sup>3</sup>	

	Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori orari da maggio a luglio	6000 µg/m <sup>3</sup> per h	
<b>B(a)P</b>	Valore obiettivo	Media annuale	<b>1,0</b> ng/m <sup>3</sup>	D.Lgs. 152/07
<b>Ni</b>	Valore obiettivo	Media annuale	<b>20,0</b> ng/m <sup>3</sup>	D.Lgs. 152/07
<b>Hg</b>	Valore obiettivo	Media annuale	Non ancora definito	D.Lgs. 152/07
<b>As</b>	Valore obiettivo	Media annuale	<b>6,0</b> ng/m <sup>3</sup>	D.Lgs. 152/07
<b>Cd</b>	Valore obiettivo	Media annuale	<b>5,0</b> ng/m <sup>3</sup>	D.Lgs. 152/07

**Tabella 1** Valori limite per la protezione della salute umana, degli ecosistemi, della vegetazione e valori obiettivo secondo la normativa vigente

## RISULTATI DELLE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO

La stazione rilocabile ha fornito valori orari misurati in continuo di parametri inquinanti convenzionali quali il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), l'ozono (O<sub>3</sub>), l'anidride solforosa (SO<sub>2</sub>), valori giornalieri del parametro inquinante PM10 e valori settimanali di alcuni Composti Organici Volatili ed in particolare Benzene, Toluene, Xileni e Etilbenzene. Inoltre sono state eseguite analisi per la caratterizzazione chimica del PM10 provvedendo alla determinazione dei seguenti composti:

- idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ed in particolare Benzo(a)Pirene;
- frazione inorganica (metalli).

Sono stati anche misurati in continuo alcuni parametri meteorologici quali temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, velocità del vento prevalente, direzione del vento. Le analisi manuali sono state eseguite in collaborazione con il Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV.


Di seguito vengono riportate le concentrazioni degli inquinanti rilevati durante le due campagne: i valori rilevati a Paderno del Grappa sono stati confrontati con quelli rilevati nel medesimo periodo presso la stazione di rilevamento di Conegliano per i parametri ossidi di azoto, ozono, anidride solforosa, PM10, meteorologici e Composti Organici Volatili, mentre con quella di Treviso per IPA e metalli. Entrambe le stazioni di Conegliano e Treviso sono di tipo background urbano.

### Monossido di carbonio (CO)


Questo gas è il risultato della combustione incompleta di sostanze contenenti carbonio. I livelli naturali di CO variano tra 0.01 e 0.23 mg/m<sup>3</sup>. Nell'arco della giornata generalmente si osservano due picchi di concentrazione, uno alla mattina e uno alla sera, corrispondenti alle ore di punta del traffico veicolare (WHO, 1979b, 1987a).

Il valore massimo giornaliero della media mobile di 8 ore non ha mai superato il limite previsto dal D.M. 60/02 pari a 10 mg/m<sup>3</sup>. Nei Grafici 1 e 2 sono riportati per ciascun giorno i valori massimi orari dell'inquinante rilevati durante le due campagne. Le concentrazioni rilevate presso

la stazione rilocabile risultano inferiori rispetto a quelle osservate presso la stazione fissa di Conegliano.



**Grafico 1:** Valori massimi orari di CO rilevati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna estiva



**Grafico 2:** Valori massimi orari di CO rilevati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna invernale

### Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)

La maggior parte degli ossidi di azoto (monossido di azoto NO e biossido di azoto NO<sub>2</sub>) sinteticamente riassunti nella formula NO<sub>x</sub>, vengono introdotti in atmosfera come NO. Questo gas inodore e incolore viene gradualmente ossidato a NO<sub>2</sub> da parte di composti ossidanti presenti in atmosfera. Si valuta che la quantità di ossidi di azoto prodotta dalle attività umane rappresenti circa un decimo di quella prodotta dalla natura, ma, mentre le emissioni prodotte da sorgenti naturali sono uniformemente distribuite, quelle antropiche si concentrano in aree relativamente




ristrette. I livelli naturali di  $\text{NO}_2$ , emessi soprattutto dall'attività batterica, oscillano nell'intervallo compreso tra meno di 1 e più di  $9 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (WHO, 1994).

L'uomo produce  $\text{NO}_x$  principalmente mediante i processi di combustione che avvengono nei veicoli a motore, negli impianti di riscaldamento domestico, nelle attività industriali. Il biossido di azoto si forma anche dalle reazioni fotochimiche secondarie che avvengono in atmosfera.


Durante la giornata le concentrazioni urbane di  $\text{NO}_2$  mostrano spesso una significativa correlazione con l'andamento dei flussi di traffico veicolare (WHO, 1999).

I Grafici 3 e 4 riportano per ciascun giorno monitorato i valori massimi orari di biossido di azoto riscontrati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile.

Le concentrazioni rilevate presso il Comune di Paderno del Grappa sono risultate mediamente inferiori rispetto a quelle rilevate presso la stazione fissa di Conegliano. In entrambe le stazioni non si è mai raggiunta la concentrazione oraria di  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare più di 18 volte per anno civile individuata come valore limite orario per la protezione della salute umana dal Decreto Ministeriale 60/02 a partire dal 2010.



**Grafico 3:** Valori massimi orari di  $\text{NO}_2$  rilevati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna estiva



**Grafico 4:** Valori massimi orari di NO<sub>2</sub> rilevati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna invernale


### Ozono (O<sub>3</sub>)

Mentre l'ozono presente negli strati alti dell'atmosfera si forma mediante processi naturali ed è indispensabile per l'assorbimento dei raggi ultravioletti, quello che si forma in prossimità del suolo è di origine antropica ed è molto dannoso.


Questo inquinante viene definito come secondario, si forma cioè in atmosfera a seguito di reazioni fotochimiche che coinvolgono ossidi di azoto, idrocarburi e aldeidi (inquinanti precursori). L'ozono è inoltre un composto fondamentale nel meccanismo di formazione dello smog fotochimico. Le sue concentrazioni tendono ad aumentare nei mesi estivi in relazione all'intensità della radiazione solare. I livelli giornalieri di ozono sono bassi al mattino (fase di innesco delle reazioni fotochimiche) e massimi nelle ore pomeridiane, per poi diminuire progressivamente nelle ore serali quando cala la radiazione solare. Le concentrazioni di ozono possono essere più elevate nelle aree suburbane o rurali rispetto a quelle urbane poiché l'ossido di azoto generato dal traffico veicolare può reagire con l'O<sub>3</sub> sottraendolo all'aria circostante e formando NO<sub>2</sub> e ossigeno molecolare (WHO, 1987a).

Nei Grafici 5 e 6 vengono riportate per ciascun giorno le concentrazioni massime orarie di ozono riscontrate presso la stazione fissa di Conegliano e presso la stazione rilocabile.

Le concentrazioni rilevate presso il Comune di Paderno del Grappa sono risultate confrontabili a quelle rilevate presso la stazione fissa durante la campagna estiva e leggermente superiori durante quella invernale. In entrambe le stazioni durante la campagna estiva si sono osservati superamenti della concentrazione oraria di 180 µg/m<sup>3</sup> individuata come soglia d'informazione dal D.Lgs. 183/04.



**Grafico 5:** Valori massimi orari di O<sub>3</sub> rilevati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna estiva



**Grafico 6:** Valori massimi orari di O<sub>3</sub> rilevati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna invernale

**Biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>)**


E' un tipico inquinante delle aree urbane e industriali dove l'elevata densità degli insediamenti ne favorisce l'accumulo soprattutto in condizioni meteorologiche di debole ricambio delle masse d'aria. Lo zolfo presente globalmente in atmosfera proviene per circa due terzi da fonti naturali (tipicamente i vulcani) e per la restante parte dall'attività dell'uomo.

Le emissioni di origine antropica sono dovute prevalentemente all'utilizzo di combustibili solidi e liquidi e sono correlate al contenuto di zolfo negli stessi, sia come impurezze sia come costituenti nella formulazione molecolare del combustibile (gli oli).


Nelle città, escludendo le emissioni industriali, la maggior sorgente di anidride solforosa è costituita dal riscaldamento domestico e perciò la concentrazione di SO<sub>2</sub> nell'aria dipende dalla stagione e dalla rigidità del clima. Tuttavia l'estesa metanizzazione per le utenze ad uso civile e la progressiva riduzione di zolfo nei combustibili liquidi ha reso, nel tempo, poco significativa la presenza di questo inquinante.

Appare trascurabile l'apporto dato dai mezzi di trasporto; attualmente il contenuto di zolfo nelle benzine è molto ridotto in quanto causa l'avvelenamento delle marmitte catalitiche, presenti ormai in molte vetture, e le rende inattive.

Nei Grafici 7 e 8 vengono riportate per ciascun giorno le concentrazioni massime orarie di biossido di zolfo riscontrate presso la stazione fissa di Conegliano e presso la stazione rilocabile. In entrambi i siti le concentrazioni dell'inquinante sono risultate nettamente inferiori al valore limite previsto dal Decreto Ministeriale 60/02 di 350 µg/m<sup>3</sup>.



**Grafico 7:** Valori massimi orari di SO<sub>2</sub> rilevati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posiziona a Paderno del Grappa – campagna estiva



**Grafico 8:** Valori massimi orari di SO<sub>2</sub> rilevati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna invernale

### **Polveri inalabili (PM10)**

Le polveri con diametro inferiore a 10 µm sono anche dette PM10 e costituiscono le cosiddette polveri inalabili. Le particelle più grandi generalmente raggiungono il suolo in tempi piuttosto brevi e causano fenomeni di inquinamento su scala molto ristretta mentre le particelle più piccole possono rimanere in aria per molto tempo in funzione della presenza di venti e di precipitazioni.

Il particolato può provenire da fonti naturali o antropiche ed essere di origine primaria o derivata da reazioni fisiche o chimiche.


Nel Bacino Padano le concentrazioni tendono infatti ad essere omogeneamente diffuse a livello regionale ed interregionale con variazioni locali non molto significative. Le concentrazioni di PM10 dipendono in parte dal contributo delle sorgenti locali, come il traffico, e in misura notevole dal background regionale ed urbano.

La produzione di materiale particolato da traffico veicolare è legata alla combustione dei carburanti contenenti frazioni idrocarburiche pesanti, pertanto viene riscontrato nei gas di scarico dei motori alimentati a gasolio e risulta praticamente assente in quelli a benzina.


Oltre alla combustione, il particolato proviene dal risollevarlo dal manto stradale e dall'usura dei pneumatici e dai freni.

Il problema delle polveri fini PM10 è attualmente al centro dell'attenzione poiché i valori limite previsti dal D.M. 60/02 sono superati nella maggior parte dei siti monitorati. In base al suddetto decreto i limiti sono di 40 µg/m<sup>3</sup> per la media annuale e di 50 µg/m<sup>3</sup> per la media giornaliera da non superare più di 35 volte l'anno.

Nei Grafici 9 e 10 si riportano le concentrazioni giornaliere di polveri inalabili PM10 riscontrate durante le due campagne presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile.



**Grafico 9:** Valori medi giornalieri di PM10 rilevati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna estiva



**Grafico 10:** Valori medi giornalieri di PM10 rilevati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna invernale

Le concentrazioni rilevate presso la stazione rilocabile risultano confrontabili rispetto a quelle rilevate nel medesimo periodo presso la stazione fissa di Conegliano. Presso entrambe le stazioni durante la campagna invernale si è osservato il superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> previsto dal Decreto Ministeriale 60/02 da non superare per più di 35 volte l'anno.

### **Composti organici volatili (COV)**

I COV (Composti Organici Volatili) sono un insieme di composti di natura organica caratterizzati da basse pressioni di vapore a temperatura ambiente, che si trovano in atmosfera principalmente in fase gassosa.


Il numero dei composti organici volatili osservati in atmosfera, sia in aree urbane sia remote, è estremamente alto e comprende oltre agli idrocarburi volatili semplici anche specie ossigenate quali chetoni, aldeidi, alcoli, acidi ed esteri. Le emissioni naturali dei COV provengono dalla vegetazione e dalla degradazione del materiale organico; le emissioni antropiche, invece, sono principalmente dovute alla combustione incompleta degli idrocarburi ed all'evaporazione di solventi e carburanti. Il principale ruolo atmosferico dei composti organici volatili è connesso alla formazione di inquinanti secondari.

Durante la campagna con stazione rilocabile sono stati effettuati dei rilevamenti settimanali dei composti organici volatili COV e in particolare BTEX (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) utilizzando i campionatori passivi Radiello®.

Tra i composti determinati assume un'importanza rilevante il benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>). Tale sostanza è stata classificata dal IARC (*International Association of Research on Cancer*) nel gruppo 1 dei cancerogeni per l'uomo (evidenza sufficiente nell'uomo). La presenza del benzene nell'aria è dovuta quasi esclusivamente ad attività di origine antropica (95-97% delle emissioni complessive). Oltre il 90% delle emissioni antropogeniche deriva da attività produttive legate al ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione dei carburanti e soprattutto traffico autoveicolare, che, da solo, rappresenta circa l'80-85% dell'emissione di benzene in ambiente atmosferico. Tale sostanza viene rilasciata sia attraverso i gas di scarico (75-80%) sia tramite le evaporazioni della benzina dalle vetture (20-25%).

Il benzene costituisce l'unico composto tra i COV per il quale è previsto un limite di legge. Infatti, in base al Decreto Ministeriale 60/02 per l'anno 2009, il Valore Limite aumentato del margine di tolleranza è di 6 µg/m<sup>3</sup> per la media annuale che andrà progressivamente a diminuire negli anni fino a raggiungere il Valore Limite di 5 µg/m<sup>3</sup> nel 2010.

Il Grafico 11 riporta i risultati del monitoraggio eseguito a Paderno del Grappa mentre nella Tabella 2 sono messe a confronto le concentrazioni medie settimanali di benzene rilevate a Paderno del Grappa e presso la stazione fissa di Conegliano.



**Grafico 11:** Valori settimanali di BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene) rilevati a Paderno del Grappa

Data	Benzene ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		Data
	Paderno del Grappa	Conegliano	
03/08-09/08	< L.R.	< L.R.	04/08-11/08
10/08-16/08	< L.R.	< L.R.	12/08-17/08
17/08-23/08	< L.R.	< L.R.	18/08-24/08
24/08-30/08	< L.R.	< L.R.	25/08-30/08
31/08-09/09	< L.R.	< L.R.	31/08-07/09
<b>Media periodo estivo</b>	<b>&lt; L.R.</b>	<b>&lt; L.R.</b>	<b>Media periodo estivo</b>
02/11-10/11	0.8	1.2	04/11-09/11
11/11-17/11	1.3	2.5	10/11-16/11
18/11-24/11	1.4	2.3	17/11-23/11
25/11-01/12	0.9	1.4	24/11-30/11
02/12-08/12	0.9	1.5	01/12-06/12
09/12-13/12	1.1	1.9	07/12-14/12
<b>Media periodo invernale</b>	<b>1.1</b>	<b>1.8</b>	<b>Media periodo invernale</b>
<b>Media</b>	<b>0.6</b>	<b>1.0</b>	<b>Media estiva e invernale</b>

< L.R.: minore del limite di rilevabilità, per il benzene è pari a  $0.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .


**Tabella 2** Concentrazioni mediate sul periodo di campionamento di benzene

Dai dati riportati in tabella si osserva che le concentrazioni di benzene durante la campagna estiva sono risultate tutte al di sotto del Limite di Rilevabilità in entrambi i siti. Durante la campagna invernale le concentrazioni dell'inquinante presso la stazione rilocabile sono risultate leggermente inferiori rispetto a quelle registrate nello stesso periodo presso la stazione fissa di Conegliano.


I valori di concentrazione di benzene, anche se non direttamente confrontabili con il limite di legge, forniscono comunque un'indicazione del valore medio annuo. La concentrazione media di benzene del 2009 presso la stazione di Conegliano è risultata di  $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$  ampiamente al di sotto del limite previsto dal DM 60/02 pari a  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$  a partire dal 2010.

### Parametri meteorologici

Nei grafici seguenti vengono riportati rispettivamente i valori dei parametri meteorologici determinati durante le due campagne ed in particolare velocità media giornaliera del vento e la sua direzione, temperatura media ed umidità media.




**Grafico 12:** Valori medi giornalieri di velocità del vento osservati presso la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna estiva




**Grafico 13:** Valori medi giornalieri di velocità del vento osservati presso la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna invernale







**Grafico 14:** Rosa dei venti presso la stazione rilocabile – campagna estiva




**Grafico 15:** Rosa dei venti presso la stazione rilocabile – campagna invernale




**Grafico 16:** Valori medi giornalieri di temperatura osservati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna estiva



**Grafico 17:** Valori medi giornalieri di temperatura osservati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna invernale



**Grafico 18:** Valori medi giornalieri di umidità osservati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna estiva



**Grafico 19:** Valori medi giornalieri di umidità osservati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile posizionata a Paderno del Grappa – campagna invernale

## LA CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DEL PARTICOLATO

La caratterizzazione chimica del particolato atmosferico prevede l'individuazione nelle polveri inalabili PM10 dei seguenti composti:

- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e in particolare del Benzo(a)Pirene (B(a)P);
- Metalli.

### **Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)**

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono una classe di idrocarburi la cui composizione è data da due o più anelli benzenici condensati. La classe degli IPA è perciò costituita da un insieme piuttosto eterogeneo di sostanze, caratterizzate da differenti proprietà tossicologiche. Gli IPA sono composti persistenti, caratterizzati da un basso grado di idrosolubilità e da una elevata capacità di aderire al materiale organico; derivano principalmente dai processi di combustione incompleta dei combustibili fossili, e si ritrovano quindi nei gas di scarico degli autoveicoli e nelle emissioni degli impianti termici, ma non solo.

Gli idrocarburi policiclici aromatici sono molto spesso associati alle polveri sospese. In questo caso la dimensione delle particelle del particolato aerodisperso rappresenta il parametro principale che condiziona l'ingresso e la deposizione nell'apparato respiratorio e quindi la relativa tossicità. Presenti nell'aerosol urbano sono generalmente associati alle particelle con diametro aerodinamico minore di 2 micron e quindi in grado di raggiungere facilmente la regione alveolare del polmone e da qui il sangue e quindi i tessuti. Poiché è stato evidenziato che la relazione tra B(a)P e gli altri IPA, detto profilo IPA, è relativamente stabile nell'aria delle diverse città, la concentrazione di B(a)P viene spesso utilizzata come indice del potenziale cancerogeno degli IPA totali. L'attuale normativa prevede un valore obiettivo per il Benzo(a)Pirene nella frazione PM10 del materiale particolato calcolato come media annuale di  $1.0 \text{ ng/m}^3$ .

Nella Tabella 3 vengono riportate le concentrazioni totali di IPA determinate a Paderno del Grappa e a Treviso intese come la somma delle concentrazioni di alcuni dei composti IPA tra i presenti che sono stati quantificati essendo considerati di rilevanza tossicologica dal D.Lgs 152/07 ovvero Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(ghi)perilene, Crisene, Dibenzo(ah)antracene, Indeno(123-cd)pirene.

Premesso che le indagini eseguite con la stazione rilocabile forniscono misure indicative dei livelli di inquinanti, come previsto all'art 2 del D.Lgs 152/07, il valore medio di concentrazione del Benzo(a)Pirene a Paderno del Grappa risulta inferiore a quello rilevato nel medesimo periodo presso la stazione di Treviso come mostrato in Tabella 3. Si ricorda che nell'anno 2009 l'Obiettivo di Qualità di  $1.0 \text{ ng/m}^3$  prefissato dal D.Lgs. 152/07 è stato superato presso la stazione fissa di Treviso con un valore di  $1.2 \text{ ng/m}^3$ .


Il Grafico 20 riporta nel dettaglio il contributo di ciascun composto IPA rilevato sui campioni giornalieri di PM10 analizzati a Paderno del Grappa durante la campagna invernale. Nel grafico non vengono riportati i risultati delle analisi eseguite sui campioni prelevati durante la campagna estiva essendo risultati sempre inferiori al Limite di Rilevabilità strumentale come già mostrato in Tabella 3.

Data	Paderno del Grappa			Treviso		
	PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	IPA $\text{ng}/\text{m}^3$	Benzo(a)Pirene $\text{ng}/\text{m}^3$	PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	IPA $\text{ng}/\text{m}^3$	Benzo(a)Pirene $\text{ng}/\text{m}^3$
06/08/09	18	< L.R.	< L.R.	19	< L.R.	< L.R.
09/08/09	17	< L.R.	< L.R.	14	< L.R.	< L.R.
12/08/09	22	< L.R.	< L.R.	16	< L.R.	< L.R.
15/08/09	12	< L.R.	< L.R.	15	< L.R.	< L.R.
18/08/09	21	< L.R.	< L.R.	28	< L.R.	< L.R.
21/08/09	38	< L.R.	< L.R.	40	< L.R.	< L.R.
24/08/09	15	< L.R.	< L.R.	16	< L.R.	< L.R.
27/08/09	29	< L.R.	< L.R.	35	< L.R.	< L.R.
30/08/09	11	< L.R.	< L.R.	5	< L.R.	< L.R.
02/09/09	31	< L.R.	< L.R.	38	< L.R.	< L.R.
05/09/09	12	< L.R.	< L.R.	N.D.	N.D.	N.D.
08/09/09	15	< L.R.	< L.R.	20	< L.R.	< L.R.
<b>Media periodo estivo</b>	<b>20</b>	<b>&lt; L.R.</b>	<b>&lt; L.R.</b>	<b>22</b>	<b>&lt; L.R.</b>	<b>&lt; L.R.</b>
04/11/09	22	8.4	1.6	21	9.4	1.7
07/11/09	21	8.4	1.6	32	9.4	1.7
10/11/09	14	8.4	1.6	23	16.3	2.5
13/11/09	50	5.1	0.9	79	16.3	2.5
16/11/09	71	5.1	0.9	94	11.4	2
19/11/09	44	9.9	1.7	69	11.4	2
22/11/09	61	9.9	1.7	64	11.4	2
25/11/09	56	4.2	0.7	74	19.0	3.4
28/11/09	55	4.2	0.7	58	19.0	3.4
01/12/09	11	4.2	0.7	14	13.6	2.2
04/12/09	7	12.1	2.3	22	13.6	2.2
07/12/09	26	12.1	2.3	57	14.9	2.7
10/12/09	22	9.8	1.8	60	14.9	2.7
13/12/09	19	9.8	1.8	20	14.9	2.7
<b>Media periodo invernale</b>	<b>34</b>	<b>8.0</b>	<b>1.5</b>	<b>49</b>	<b>14.0</b>	<b>2.4</b>
<b>Media</b>	<b>28</b>	<b>4.3</b>	<b>0.8</b>	<b>37</b>	<b>7.8</b>	<b>1.3</b>

< L.R.: minore del limite di rilevabilità, per il B(a)P e IPA è pari a  $0.1 \text{ ng}/\text{m}^3$ .

N.D. Dato non disponibile.


**Tabella 3** Concentrazioni di IPA e B(a)P determinate su PM10 a Paderno del Grappa e presso la stazione fissa di Treviso



**Grafico 20:** Valori di IPA rilevati su campioni giornalieri di PM10 prelevati a Paderno del Grappa nel sito di monitoraggio

Il Grafico 21 mette a confronto le concentrazioni medie relative alla campagna invernale dei singoli composti IPA determinati sui campioni di PM10 prelevati a Paderno del Grappa e a Treviso.

Si osserva che le concentrazioni di ciascun composto IPA risultano mediamente inferiori presso il sito di Paderno del Grappa rispetto a quanto riscontrato presso la stazione di Treviso.



**Grafico 21:** Confronto tra i valori di IPA determinati su campioni di PM10 prelevati nel sito di monitoraggio e presso la stazione fissa di Treviso durante la campagna invernale

## **Metalli**

Alla categoria dei metalli pesanti appartengono circa 70 elementi, anche se quelli rilevanti da un punto di vista ambientale sono solo una ventina. Tra i più importanti ricordiamo: Ag, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Mo, Ni, Sn, Zn.

Le fonti antropiche responsabili dell'incremento della quantità naturale di metalli sono principalmente l'attività mineraria, le fonderie e le raffinerie, la produzione energetica, l'incenerimento dei rifiuti e l'attività agricola. I metalli pesanti sono presenti in atmosfera sotto forma di particolato aerotrasportato; le dimensioni delle particelle a cui sono associati e la loro composizione chimica dipende fortemente dalla tipologia della sorgente di emissione. Le concentrazioni in aria di alcuni metalli nelle aree urbane e industriali può raggiungere valori 10-100 volte superiori a quelli delle aree rurali.

La Tabella 4 riporta i valori medi di concentrazione in aria dei metalli pesanti, per i quali è previsto un limite di legge, rilevati nelle polveri inalabili PM10 durante la campagna di monitoraggio a Paderno del Grappa e durante l'anno 2009 presso la stazione fissa di Treviso.

Metallo (ng/m <sup>3</sup> )	Paderno del Grappa Valore medio campagna	Treviso		Valore di rif. D.Lgs. 152/07
		Valore medio campagna	Valore medio anno 2009	
Arsenico	0.4	1.0	0.5	6.0
Cadmio	0.1	0.4	0.2	5.0
Nickel	2.3	7.2	5.0	20.0
Mercurio	<L.R.	<L.R.	<L.R.	n.d
Piombo	7.4	17.8	13.8	500 (D.M. 60/02)

< L.R.: minore del limite di rilevabilità, per il Mercurio è pari a 1.0 ng/m<sup>3</sup>.

**Tabella 4** Concentrazioni media dei metalli nel PM10 rilevati presso la stazione rilocabile durante la campagna di monitoraggio e presso la stazione fissa di Treviso

Per quanto le indagini forniscano informazioni indicative sui livelli di inquinanti è possibile osservare che i valori di concentrazione dei metalli pesanti rilevati a Paderno del Grappa e presso la stazione di Treviso, risultino largamente al di sotto del Valore Obiettivo previsto dal D.Lgs. 152/07. Tali inquinanti, anche in basse concentrazioni, possono fungere da catalizzatori di reazioni radicaliche che stanno alla base della formazione dello smog fotochimico.

## **CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PER IL PARAMETRO PM10**

Si ricorda che in data 28 luglio 2006 è stata approvata dal Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) Provinciale di Treviso la zonizzazione del territorio provinciale secondo la quale il comune di Paderno del Grappa risulta classificato in "Zona C Provincia" sulla base di criteri tecnici ed amministrativi. Tale zonizzazione, trasmessa al Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), è stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n° 3195 del 17 ottobre 2006.

Di seguito viene valutata la caratterizzazione dell'area comunale di Paderno del Grappa in merito all'inquinamento da PM10.

Data	PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		Data	PM10 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	
	Paderno del Grappa	Conegliano		Paderno del Grappa	Conegliano
04/08/09	F.S.	9	03/11/09	10	19
05/08/09	14	7	04/11/09	22	27
06/08/09	18	13	05/11/09	10	22
07/08/09	21	16	06/11/09	4	18
08/08/09	19	7	07/11/09	21	29
09/08/09	17	F.S.	08/11/09	9	18
10/08/09	22	F.S.	09/11/09	7	9
11/08/09	18	12	10/11/09	14	25
12/08/09	22	5	11/11/09	12	27
13/08/09	20	8	12/11/09	18	46
14/08/09	15	9	13/11/09	50	55
15/08/09	12	11	14/11/09	69	67
16/08/09	20	10	15/11/09	58	65
17/08/09	16	14	16/11/09	71	85
18/08/09	21	15	17/11/09	87	122
19/08/09	27	21	18/11/09	79	104
20/08/09	33	26	19/11/09	44	55
21/08/09	38	28	20/11/09	57	63
22/08/09	25	12	21/11/09	59	65
23/08/09	10	5	22/11/09	61	76
24/08/09	15	13	23/11/09	50	59
25/08/09	18	17	24/11/09	62	72
26/08/09	21	12	25/11/09	56	62
27/08/09	29	27	26/11/09	66	77
28/08/09	37	28	27/11/09	33	48
29/08/09	29	16	28/11/09	55	64
30/08/09	11	6	29/11/09	48	56
31/08/09	16	F.S.	30/11/09	26	35
01/09/09	28	20	01/12/09	11	16
02/09/09	31	21	02/12/09	11	21
03/09/09	27	18	03/12/09	19	33
04/09/09	26	24	04/12/09	7	14
05/09/09	12	5	05/12/09	14	24
06/09/09	8	2	06/12/09	25	36
07/09/09	13	16	07/12/09	26	45
08/09/09	15	20	08/12/09	20	17
09/09/09	15	23	09/12/09	12	36
			10/12/09	22	35
			11/12/09	27	56
			12/12/09	20	26
			13/12/09	19	23
<b>Media di periodo</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>Media di periodo</b>	<b>34</b>	<b>45</b>
<b>N° giorni di superamento</b>	<b>0 su 36</b>	<b>0 su 34</b>	<b>N° giorni di superamento</b>	<b>12 su 41</b>	<b>17 su 41</b>

F.S.: strumento fuori servizio


< L.R.: minore del limite di rilevabilità, per il PM10 è pari a  $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$

**Tabella 5** Confronto delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a Paderno del Grappa con quelle misurate a Conegliano presso la stazione fissa della rete ARPAV

Il D.M. 60/02 prevede, per il parametro PM10, un periodo minimo di copertura necessario per una corretta valutazione della qualità dell'aria nel caso di misure indicative (campagne con stazione rilocabile) pari al 14% dell'anno ovvero almeno 52 giorni di rilevamento.

Nel presente caso, sono stati considerati tutti i dati di PM10 rilevati durante le due campagne di monitoraggio per un totale di 77 giorni di rilevamento.

Il confronto tra i dati rilevati presso la stazione fissa di Conegliano e la stazione rilocabile evidenzia una buona correlazione come mostrato nel Grafico 22.



**Grafico 22:** PM10 - rapporto tra la stazione rilocabile e quella di Conegliano

Allo scopo di verificare la classificazione in Zona C Provincia del territorio comunale di Paderno del Grappa è stata utilizzata una metodologia di calcolo elaborata dall'Osservatorio Regionale Aria di ARPAV per valutare il rispetto dei limiti di legge previsti dal D.M. 60/02 per il parametro PM10, ovvero il rispetto del Valore Limite su 24 ore di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  e del Valore Limite annuale di  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Tale metodologia consente infatti di stimare, per il sito sporadico, sulla base dei dati acquisiti durante le due campagne di misura e di quelli rilevati presso la stazione fissa, il Valore medio annuale del PM10 e se la concentrazione giornaliera del PM10 potrà superare il Valore Limite su 24 ore per più di 35 giorni all'anno.

La metodologia di calcolo sopra citata, che utilizza l'accoppiamento dei dati delle due stazioni (fissa e sporadica), stima per il sito sporadico di Paderno del Grappa, un valore medio annuale pari a  $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (inferiore al Valore Limite annuale previsto dal DM 60/02 di  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) e un numero di superamenti del Valore Limite giornaliero per il PM10, pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , inferiore a 35 (il 90° percentile risulta pari a  $42 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

## CONCLUSIONI

La qualità dell'aria nel Comune di Paderno del Grappa è stata valutata in seguito a due campagne di monitoraggio, mediante stazione rilocabile posizionata presso il municipio, effettuate nel semestre caldo e freddo rispettivamente dal 04/08/2009 al 09/09/2009 e dal 03/11/2009 al 13/12/2009.

Il monitoraggio ha permesso di disporre di valori orari misurati in continuo di parametri inquinanti convenzionali:

- ✓ Monossido di carbonio CO;
- ✓ Ossidi di azoto NO<sub>x</sub>;
- ✓ Ozono O<sub>3</sub>;
- ✓ Anidride solforosa SO<sub>2</sub>;

campioni giornalieri del parametro inquinante PM10 su alcuni dei quali sono stati eseguite le analisi di IPA e metalli e valori settimanali di Benzene, Toluene, Xileni ed Etilbenzene.

Con l'obiettivo di proporre un confronto con una realtà urbana monitorata in continuo, è stata fornita per gli inquinanti monitorati l'indicazione dei valori medi registrati nel medesimo periodo presso le stazioni fisse di Conegliano e Treviso.

Si sottolinea che la valutazione del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa per i dati ambientali rilevati a Paderno del Grappa deve essere considerata, in particolare per i parametri a lungo termine, esclusivamente con valore indicativo essendo il monitoraggio eseguito per un breve periodo secondo le modalità e tempistiche indicate dalla normativa.

Per quanto riguarda gli inquinanti CO, SO<sub>2</sub> e NO<sub>x</sub> non sono stati rilevati valori superiori ai limiti di legge, mentre per l'inquinante PM10 si sono osservati durante la campagna invernale superamenti del Valore Limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> previsto dal Decreto Ministeriale 60/02 da non superare per più di 35 volte l'anno. Analogamente si sono osservati durante la campagna estiva alcuni superamenti per l'O<sub>3</sub> della concentrazione oraria di 180 µg/m<sup>3</sup> individuata come soglia di informazione dal D.Lgs. 183/04.

Per i parametri PM10 e Ozono la stazione fissa di Conegliano può ritenersi rappresentativa della qualità dell'aria del territorio comunale di Paderno del Grappa.

Le concentrazioni di alcuni dei COV determinati (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) a Paderno del Grappa sono risultate confrontabili a quelle rilevate nel medesimo periodo a Conegliano. Si ricorda che nell'anno 2009 il valore medio annuale di benzene presso la stazione di Conegliano è risultata pari a 1 µg/m<sup>3</sup> nettamente inferiore al Valore Limite di 5 µg/m<sup>3</sup> previsto dal DM 60/02 per il 2010.

La caratterizzazione chimica del PM10 ha portato a determinare concentrazioni di **metalli** largamente al disotto del Valore Obiettivo previsto dal D.Lgs 152/07 pur non essendo i risultati, per quanto premesso, direttamente confrontati con il limite di legge. Se dal punto di vista del rispetto dei limiti di legge la presenza dei metalli nei PM10 non risulta essere un problema bisogna considerare che tali inquinanti, anche in basse concentrazioni, possono fungere da catalizzatori di reazioni radicaliche che stanno alla base della formazione dello smog fotochimico.

La determinazione di IPA sui PM10, ed in particolare di **Benzo(a)Pirene**, ha evidenziato la presenza di concentrazioni inferiori rispetto a quelle determinate nello stesso periodo presso la



stazione fissa di Treviso. Sebbene i risultati non siano direttamente confrontabili con il limite di legge, si ricorda che nell'anno 2009 l'Obiettivo di Qualità di  $1.0 \text{ ng/m}^3$  prefissato dal D.Lgs. 152/07 è stato superato presso la stazione fissa di Treviso con un valore di  $1.2 \text{ ng/m}^3$ .

I dati di PM10 raccolti sono stati valutati allo scopo di proporre una caratterizzazione dell'area comunale come aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera PRTRA. A tal fine è stata utilizzata una metodologia di calcolo elaborata dall'Osservatorio Regionale Aria di ARPAV.

L'applicazione della metodologia di stima proposta ai fini della caratterizzazione dell'area del Comune di Paderno del Grappa per il PM10 ha evidenziato che il valore medio annuale stimato ( $25 \text{ ug/m}^3$ ) è presumibilmente inferiore al limite previsto dal DM 60/02 ( $40 \text{ ug/m}^3$ ).

Considerato il margine d'incertezza tipico delle stime indicative (almeno pari al 50%) risulta però evidente che sussiste il rischio di superamento del valore limite giornaliero ( $50 \text{ ug/m}^3$  per più di 35 giorni all'anno); infatti la stima di tale limite è strettamente legata a valutazioni di breve termine che risentono in modo determinante dell'effetto dei fattori meteorologici (condizioni di stabilità vs instabilità atmosferica) che, come noto dall'esperienza derivante dal monitoraggio del PM10 effettuato da ARPAV su tutto il territorio veneto in modo continuativo e sistematico da almeno 8 anni, sono in grado di produrre fluttuazioni e variazioni di concentrazione del PM10 estremamente forti.

In estrema sintesi, allo stato attuale gli elementi di giudizio disponibili non forniscono una base conoscitiva sufficiente per procedere ad una proposta di modifica della classificazione territoriale del Comune di Paderno del Grappa per il quale non si può che confermare pertanto la classificazione in fascia C (cioè a basso rischio) per il PM10.

Il Responsabile dell'istruttoria  
*Dott. Federico Steffan*

Il Responsabile del Servizio  
Sistemi Ambientali  
*Dr.ssa Maria Rosa*

Si rammenta che la presente Relazione Tecnica può essere riprodotta solo integralmente. L'utilizzo parziale richiede l'approvazione scritta del Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso e la citazione della fonte stessa.