

Il tempo previsto nei prossimi giorni


Evoluzione Generale Temporanea fase di tempo più stabile con comparsa di schiarite fino alla prima parte di giovedì. Seguirà un progressivo peggioramento e nuove precipitazioni dalla serata di giovedì con apice del maltempo venerdì. Domenica possibile nuovo impulso perturbato la cui evoluzione rimane ancora incerta.

www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php

	giovedì 14		venerdì 15		sabato 16	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Probabilità Precipitazioni	0 %	0/20%	80/100 %	80/100 %	60/80 %	60/80 %
Venti	Moderati-Nord/Orientali		Moderati-Nord/Orientali		Moderati-Nord/Orientali	
Temperatura	Min ↓	Max =	Min ↑	Max =	Min ↑	Max =

Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio			base 10 dal 1 aprile		
	2019	2018	storica	2019	2018	storica
ZB	5004	5225	4531	2163	2429	1794
RC	4807	5074		2006	2303	


ZB = Zero Branco; RC = Roncade

Dai Servizi Fitosanitari

- settore orticolo -

Radichio In campagna la situazione fitosanitaria è per il momento soddisfacente e le rese a ettaro delle diverse tipologie di radichio, sono nella norma. Qualche problema per il Radichio Tardivo di Treviso dopo la forzatura nelle vasche d'imbianchimento, con Marciumi batterici che si sviluppano in seguito alla lavorazione/commercializzazione. Le cause sono di natura agronomica/climatica, su partite deboli a livello fogliare a causa di una concimazione AZOTATA eccessiva e per la mancanza di basse temperature. In generale va mantenuta su tutte le tipologie in raccolta a dicembre, un minimo di copertura con prodotti RAMEICI e ZOLFO, se le temperature rimangono le attuali o con prodotti ANTIMARCIUME in caso di una consistente riduzione della temperatura. Intervenire appena la condizione del terreno lo permetterà.

Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



Precipitazioni (mm) ultimi giorni

stazione/giorni	06/11	08/11	09/11	11/11	12/11
Zero Branco	1	16	3,6	2,8	30,4
Roncade	1,4	20,8	4,6	3,6	33,4
Breda di P. Bovon	1	27	4,8	3,8	38,6
Mogliano	1,2	23,4	4	2,6	30,8

Prodotti Fitosanitari

Ammessi o Vietati nelle aree popolate

Con Deliberazione della Giunta Regionale, DGR n. 1082 del 30/07/2019, sono stati aggiornati gli "Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari" e la "Proposta di Regolamento comunale/intercomunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse". Come previsto dalla Deliberazione, vengono inoltre pubblicate le **liste dei prodotti ammessi** nelle aree frequentate dalla popolazione **o vietati** in prossimità delle stesse, **al fine di fornire indicazioni specifiche alle amministrazioni comunali**. Per maggiori informazioni, consultare la pagina di riferimento dedicata (box: Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e proposta di regolamentazione comunale).

<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>

Servizio "Angela"

Allerta gelate precoci

www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/servizi/angela-10

Bollettino colture erbacee

www.venetoagricoltura.org/argomento/bollettino-culture-erbacee/


- settore olivicolo -

Fenologia Oramai si stanno concludendo le operazioni di raccolta. In questa settimana le rese in olio sono state: basso lago di Garda 12-13%; medio lago di Garda 12,5-14%; alto lago di Garda 14-15%; colline veronesi 12-13%, colli Euganei 12-13%; Colli Berici 12,5-14%; Pedemontana vicentina e trevigiana 13-14%. **Situazione fitosanitaria Mosca** dell'olivo (*Bactrocera oleae*): le piogge di questi giorni e gli abbassamenti delle temperature, particolarmente quelle notturne, stanno portando allo sfinitimento generazionale del dittero. Le catture di adulti sono state comprese tra a 0 e 7 individui, di questi l'80% sono stati maschi. Sulle olive ancora da cogliere la presenza d'infestazioni, con larve di seconda e terza età, hanno superato la soglia dell'8-10%. Le condizioni climatiche, anche se al momento creano difficoltà al dittero, non sono ancora tali da fermarne il suo sviluppo, si consiglia, pertanto, di concludere al più presto la raccolta. Si sta osservando che molte olive rimarranno sulle piante, non raccolte per mancanza di economicità in quest'annata di scarica. Questo fatto potrebbe offrire la possibilità alle larve di Mosca di trascorrere l'inverno all'interno di queste drupe; per quanto possibile sarebbe opportuno una loro rimozione e allontanamento dall'oliveto. **Occhio di pavone** (*Spilocaea oleaginea*)...


www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeoregione/veneto.html

Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.

Stazione di Breda di P. Bovon



Evapotraspirazione Potenziale (mm/g) ultimi 8 giorni



Il proverbio della settimana

L'istadela de San Martin, senza forsa e morbin

La fase lunare

Luna calante



Il prossimo bollettino

mercoledì 20 novembre