

Il tempo previsto nei prossimi giorni


Evoluzione Generale Tempo instabile con precipitazioni, rovesci e temporali giovedì. Venerdì, l'influenza della bassa pressione sarà un po' più marginale ed interesserà più che altro la montagna e la pianura settentrionale. Sabato il tempo sarà relativamente più stabile anche sulle zone montane; mentre domenica e lunedì potrebbero ripresentarsi dei tratti di variabilità.

www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/index.php

	venerdì 17		sabato 18		domenica 19	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
Probabilità Precipitazioni	0 %	0/20%	Nulla 0 %		Bassa 0/20 %	
Venti	Moderati-Sud/Occidentali		Deboli/Moderati da S/E		Deboli/Moderati da S/E	
Temperatura	Min ↓	Max ↑	Min =	Max ↑	Min ↑	Max =

Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio		base 10 dal 1 aprile	
	2024	2023 storica	2024	2023 storica
CH	1429	1309	1197	242,9
DV	1399	1281	1189	235,2

CH = Chioggia; DV = Codevigo

Precipitazioni (mm) ultimi giorni

stazione/giorni	15/5
Chioggia	1,4
Cavarzere-Gesia	2,4
Codevigo	4,4
Adria	5,4
Rosolina	2,6

Dai Servizi Fitosanitari

- settore frutticolo -

Melo Fase fenologica di ingrossamento del frutto (25-30 mm). Ticchiolatura: sono terminate le infezioni primarie. Sono sempre possibili le infezioni secondarie, anche in caso di piogge leggere. E' quindi importante in questo periodo mantenere costantemente coperta la vegetazione, in particolare prima della pioggia. Oidio: l'andamento climatico è sempre favorevole al patogeno, per cui è necessario continuare la strategia di difesa. Aggiungere sempre un antioidico specifico ad ogni trattamento, cercando di variare le sostanze attive che si impiegano in base al loro meccanismo di azione. Carpocapsa: continua il volo, l'ovideposizione e si osservano le prime nascite. A 12-14 gg dal primo trattamento è il momento di intervenire con il secondo, utilizzando la sostanza attiva in funzione dei programmi scelti (Clorantranilprole, Tebufenozide, Emamectina, Virus etc.). Afide lanigero: cominciano ad essere visibili le primissime neo-colonie. I dati derivanti dalle fasce trappola indicano che è stato raggiunto il picco della migrazione, che mostra una flessione. In questa fase sono ancora utili i trattamenti con prodotti a base di Sali Potassici di Acidi Grassi od Olio di Arancio dolce. E' anche il momento opportuno per effettuare il trattamento con un aficida specifico.

Pero Accrescimento frutticini con calibri dai 15 ai 30 mm di diametro a seconda delle varietà. Psilla: sulla vegetazione si nota la presenza di uova bianche e gialle, neanidi ed adulti. Se non già fatto, è ancora possibile effettuare il trattamento con SPIROTETRAMAT o SPINETORAM. Sempre utile il trattamento con CAOLINO, da effettuarsi entro fine maggio/inizio giugno. Efficace per il controllo di psilla anche il rilascio del predatore ANTOCORIS NEMORALIS, nel numero di 2000 esemplari ad ettaro, da praticare in 2 tempi, a metà e fine maggio....

Pesce/Albicocco/Susino/Ciliegio/Actinidia


- settore viticolo/olivicolo -

www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/bollettini/bollettino-agrometeorologico-regionale

Bollettino Colture Erbacee

www.venetoagricoltura.org/argomento/bollettino-culture-erbacee/

Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



Peronospora Solanacee

Rosolina	
11 maggio	4,6
12 maggio	4,6
13 maggio	4,6
14 maggio	4,8
15 maggio	5,8

Ticchiolatura del Melo


GESIA		
INFEZIONE PRIMARIA	LIVELLO GRAVITA'	% INCUB.
15-mag	Media	12.4
06-mag	Grave	95.4
01-mag	Grave	100

Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.

Stazione di Cavarzere




Evapotraspirazione Potenziale (mm/gg) ultimi 8 giorni



Indice di fienagione

Stazione di Adria



Il proverbio della settimana

Quando el tempo vien de sora, to' la zapa e laora

La fase lunare

Luna crescente



Il prossimo bollettino

lunedì 20 maggio