

Dip. Regionale per la Sicurezza del Territorio Centro Meteorologico di Teolo U.O.di Agro-Biometeorologia


# **AGROMETEO MESE**

### **N° 4 APRILE 2008**


Copertura: regionale Periodicità: annuale Frequenza: mensile www.arpa.veneto.it

## ANDAMENTO AGROCLIMATICO APRILE 2008

**TEMPERATURE (\*):** in pianura le minime sono state generalmente superiori alla media di circa 0.5, 1°C rispetto alla media del periodo di riferimento 1994-2007 mentre le temperature massime sono state generalmente inferiori alla media di circa -1°C.




**PRECIPITAZIONI\*(P):** nel mese di APRILE la cumulata totale delle piogge è oscillata tra i 40 ed i 280 mm; rispetto al periodo 1994-2007, la sua anomalia è stata negativa solo sulla pianura meridionale del rodigino con valori compresi generalmente tra 0 e -15 mm. L'anomalia è invece risultata positiva sul resto della pianura, con valori generalmente compresi tra 0 e 40 mm.




# **AGROMETEO MESE**

**N° 4 APRILE 2008** 

**INDICE SPI (STANDARIZED PRECIPITATION INDEX) APRILE** \*\*: dall'esame dello SPI di APRILE e rispetto al periodo 1994-2007, emerge una situazione generalmente nella norma su tutta la regione.



**EVAPOTRASPIRAZIONE POTENZIALE (ET0)** \*\*\*: la quantità totale di acqua evapotraspirata stimata è stata compresa tra i 30 ed i 75 mm. Le anomalie di evapotraspirazione, ottenute dal confronto con i valori medi del periodo 1994-2007, sono state quasi ovunque negative e comprese tra 0 e -16 mm.






## **AGROMETEO MESE**

### **N° 4 APRILE 2008**

**BILANCIO IDROCLIMATICO (P-ETO)**\*\*\*\*: su gran parte della regione è risultato positivo con valori compresi tra i -40 e 220mm; le anomalie di bilancio idroclimatico, ottenute dal confronto con i valori medi del periodo 1994-2007, sono state negative solo nel Polesine con valori compresi generalmente tra 0 e -20 mm. Anche in questo mese l'anomalia del B.I. è sostanzialmente imputabile all'anomalia delle precipitazioni essendo generalmente l'anomalia dell'ETO di scarsa entità.



#### NOTE:

(\*)

Il calcolo delle anomalie delle temperature e delle piogge è riferito al periodo di riferimento 1994-2007

#### (\*\*) SPI

l'indice SPI (Standarized Precipitation Index (Mc Kee et al. 1993), consente di definire lo stato di siccità in un a località. quantifica il deficit o surplus di precipitazione per diverse scale dei tempi; ognuna di queste scale riflette l'impatto della siccità sulla disponibilità di differenti risorse d'acqua. L'umidità del suolo risponde alle anomalie di precipitazione su scale temporali brevi (1-3 mesi), mentre l'acqua nel sottosuolo, fiumi e invasi tendono a rispondere su scale più lunghe (6-12-24 mesi). L'indice è calcolato considerando la deviazione della precipitazione rispetto al suo valore medio su una data scala temporale, divisa per la sua deviazione standard. Essendo standardizzato consente il confronto tra stazioni climatologicamente diversi.

A. Chiaudani; Cacciatori, G, G.Tridello., M. Borin, F. Salvan, Studio della siccità in Veneto negli anni 1961-2004: SPI (Standarized Precipitation Index). in "Rivista Italiana di Agrometeorologia", anno 9, n.1, aprile 2005, pp. 26-27 (www.agrometeorologia.it/documenti/atti 2005/26.pdf)

#### (\*\*\*)

### EVAPOTRASPIRAZIONE POTENZIALE

Il calcolo dell'evapotraspirazione potenziale è basato sull'equazione di Hargreaves (radiazione solare stimata). Hargreaves e Samani (1982, 1985) considerando che spesso non sono disponibili dati di radiazione solare globale, suggerirono di stimare la Rg a partire dalla radiazione solare extraterrestre (vale a dire quella che giunge su una ipotetica superficie posta al di fuori dell'atmosfera) e dall'escursione termica del mese considerato (differenza tra la temperatura massima media e quella minima media del mese).

## (\*\*\*\*)

#### **BILANCIO IDROCLIMATICO**

Il calcolo del bilancio idro-climatico, è saldo tra la precipitazione e l'evapotraspirazione potenziale espresso in mm.