Precipitazioni Nei primi quindici giorni di agosto la distribuzione delle precipitazioni sul Veneto è risultata nettamente differenziata. Si sono verificati apporti consistenti sull'area Dolomitica, dove sono caduti 50-125 mm di precipitazione, ed in generale sull'intero Veneto orientale dove sono caduti 20-50 mm. Gli apporti decrescono sensibilmente verso la parte occidentale della regione ed in particolare nel Veronese meridionale, dove le precipitazioni cadute da inizio mese sono dell'ordine di 2-4 mm.

I massimi apporti del periodo sono registrati dalla stazione di Passo Falzarego (BL) dove sono caduti 142 mm. Si segnalano anche i 137 mm caduti a Ponte Rio Cordon (Selva di Cadore - BL) ed i 134 mm caduti a Misurina (BL).

Nella pianura il massimo quantitativo registrato è costituito dai 64 mm di Roncade (TV). Gli apporti minimi, pari a 2 mm, sono stati rilevati dalla stazione di Sorgà (VR), e anche le vicine stazioni di Vangadizza (VR) e Roverchiara (VR) hanno misurato apporti di circa 3 mm.

Nei primi quindici giorni di agosto si sono verificate precipitazioni significative nei giorni:

- 1: fenomeni presenti sull'intero territorio regionale, con apporti in pianura variabili tra i 2-4 mm del Veronese ed i 10-15 mm sul Delta del Po e sul Trevigiano meridionale. Sulle Prealpi quantitativi di 8-15 mm (max. 20 mm a Valpore-Monte Grappa-BL) e sulle Dolomiti 5-10 mm;
- 2: apporti di 8-25 mm sull'area Dolomitica (max. 32 mm a Passo Falzarego - BL) e di 5-15 mm sul Veneziano centrale e Trevigiano meridionale (16 mm a Mira - VE). Sul resto della Regione precipitazioni modeste (1-5 mm) o assenti;
- 4: precipitazioni localizzate sulle Dolomiti settentrionali dove cadono 10-30 mm (max. 36 mm a Costalta - S. Pietro di Cadore - BL);
- 5: modestissime precipitazioni prevalentemente sulle Prealpi Vicentine centrali e Dolomiti;
- 7: piogge localizzate sulle Dolomiti settentrionali, localmente consistenti (max. 27 mm a Misurina - BL);
- 8: precipitazioni prevalentemente sull'area Dolomitica centro settentrionale, dove cadono 5-40 mm (max. 43 mm a Passo Falzarego - BL), e modeste precipitazioni sparse sulle Prealpi;
- 9: precipitazioni modeste e localizzate vengono registrate sul Bellunese;
- 10: precipitazioni localizzate su una limitata porzione del Veneto meridionale (max. 12 mm a Bagnolo di Po - RO);

Precipitazioni cumulate dal 1 al 15 agosto 2015 (mm)

- 14: fenomeni che interessano in particolare il Bellunese nord occidentale, dove cadono 5-30 mm (max. 35 mm a Caprile - BL), ed il Veneziano centro-meridionale dove cadono 2-15 mm (max. 19 mm a Valle Averte - VE). Precipitazioni modestissime o assenti altrove;
- 15: apporti generalmente dell'ordine di 20-30 mm su gran parte del Bellunese, Trevigiano e Veneziano orientale. Quantitativi di 5-20 mm sulla pianura sud-orientale e precipitazioni modeste (1-5 mm) o assenti sul resto del territorio.

Riserve nivali La prima quindicina del mese di Agosto ha registrato una temperatura media dell'aria di +3.0°C superiore alla media 1990-2014. Il giorno più fresco è stato il 1 agosto, il più caldo il 7 agosto. Il periodo 1 giugno-15 agosto è il secondo più caldo dopo il 2003, sopravanzando anche il 1998. Sui ghiacciai dolomitici, la neve stagionale è scomparsa mettendo alla luce la neve della stagione 2014 o il ghiaccio direttamente. Residua e localizzata neve stagionale è presente nelle zone di deposito da valanga o spiccatamente sottovento in alta quota. Fino al giorno 15, non è stata registrata nessuna nevicata estiva in alta quota, come nell'estate del 1993. Le *riserve idriche* (SWE) a metà luglio sono ormai irrilevanti.

Lago di Garda Il livello del lago, in forte calo dalla fine del mese di giugno, alla data del 15 agosto si sta ormai velocemente avvicinando a quello degli ultimi anni siccitosi.

Serbatoi Nella prima quindicina di agosto il volume complessivamente invasato nei principali serbatoi del Piave è ulteriormente calato (-9,5 Mm³ da fine luglio), risultando a metà agosto sui 111 Mm³ (tra il 5° ed il 25° percentile), pari al 66% del volume massimo invasabile e ancora nella norma del periodo (-6%). Il volume a metà agosto 2015 risulta essere decisamente superiore ai minimi del 2003 (invasi praticamente vuoti, 5,8 Mm³!) e 2005-2006 (+66% e +44%), e solo di poco inferiore al 2012 (-10%). In particolare, risultano assolutamente nella media del periodo i volumi invasati sui serbatoi di Pieve di Cadore e Santa Croce, mentre appare sotto la media (-29%) il volume del Mis, all'incirca al 40% del volume massimo invasabile e calato di quasi 6 Mm³ da fine luglio.

Volume in consistente calo anche sul serbatoio del Corlo (Brenta), con valori a metà agosto sui 21 Mm³ (9 Mm³ in meno rispetto alla fine di luglio), poco più della metà del volume invasabile (+54%), tra il 5° percentile e la mediana, inferiore alla media del periodo (-30%), circa quattro volte il minimo del 2003 e poco maggiore degli scarsi anni 2012 e 2005 (+17% e +9%). Il volume complessivamente accumulato dall'inizio dell'anno idrologico (01 ottobre) si conferma poco sopra la media per i principali serbatoi del Piave (+10%) e pochissimo sotto (-4%) per il Corlo.

Portate Sulle sezioni naturali montane del Piave deflussi **in ripresa** con le piogge di fine periodo. Considerando i dati strumentali delle stazioni idrometriche, integrati con le più recenti misure di portata in alveo, si possono stimare al 15 agosto portate comprese tra il 75° ed il 95° percentile (solo sul Cordevole si collocano tra la mediana ed il 75° percentile), con valori uguali o superiori alla media storica del periodo: -1%\-2% sul Cordevole (Saviner) e alto Piave (Ponte della Lasta), +26% sul Boite (Cancia). Il contributo unitario a metà mese risulta diversificato e rispettivamente di 21, 30 e 37 l/s*km². Stessa situazione statistica per la portata media della quindicina, con valori uguali (Cordevole) o superiori alla portata media mensile storica: +21% sull'alto Piave e +24% sul Boite. Contributi unitari medi della quindicina variabili tra 21 (Cordevole) e 35 (Boite) l/s*km². Deflussi altalenanti ed in ulteriore calo sul bacino prealpino del t. Sonna a Feltre: la portata al 15 agosto è tuttora molto bassa, inferiore al 5° percentile, all'incirca la **metà della media** del periodo (-53%), leggermente inferiore anche ai valori del 2003 e 2012. Anche la portata media della quindicina si mantiene sotto il 5° percentile, ben sotto la media mensile storica (-43%). Contributo unitario a metà luglio di 9,3 l/s*km² e medio di 10,4 l/s*km².

Sull'alto Bacchiglione situazione, per una volta, omogenea, con deflussi assai ridotti ed in ulteriore leggero calo. I dati strumentali, opportunamente rivalutati ed integrati con le più recenti misure di portata, evidenziano portate tra il 5° ed il 25° percentile e ancora **molto sotto la norma**:

- sia a metà agosto, con identico scarto (-86%) per l'Astico ed il Posina, e contributo unitario rispettivamente 5 e 2,8 l/s*km². Sono portate poco superiori al 2003 ed in linea col 2012;
- sia come media dei quindici giorni, -62% rispetto alla portata media mensile storica sull'Astico e -68% sul Posina, con contributo unitario medio della quindicina di 5,4 e 4 l/s*km².

Considerando la curva di durata storicamente rappresentativa, le portate a metà luglio rappresentano deflussi di durata 80-100 giorni sulle sezioni montane del Boite e alto Piave (150 sul Cordevole), 355 giorni sul Sonna e 300-345 giorni su Astico e Posina. Il volume defluito nell'anno idrologico (dal 01 ottobre) si mantiene ancora piuttosto elevato con scarti rispetto al volume storicamente defluito nello stesso periodo tra +6% del Cordevole e +28% dell'alto Piave (+26% sul Sonna). Alla data del 15 agosto le portate di tutti i maggiori fiumi veneti, ad eccezione del Po in lieve ripresa, si mantengono paragonabili a quelle degli ultimi periodi siccitosi.