

Acque marino costiere. Nella **tabella** sono riportati i valori dei principali parametri rilevati in superficie con sonda multiparametrica, mediati per corpo idrico.

Dalle **mappe di distribuzione** si evidenzia che la temperatura è risultata pressoché omogenea in tutti i corpi idrici, ad eccezione di quello antistante la foce dei fiumi Brenta-Bacchiglione e Adige (CE1_3) dove è risultata leggermente più bassa.

La salinità ha raggiunto i valori più bassi in prossimità del corpo idrico di fronte la foce del fiume Po (CE1_4).


Per quanto riguarda l'ossigeno disciolto, in tutti i corpi idrici monitorati, i valori si sono attesi attorno alla saturazione.

Le misure di trasparenza, effettuate mediante disco di "Secchi", sono risultate più elevate nelle stazioni localizzate tra i litorali di Pellestrina e Ca' Roman.

Le osservazioni con telecamera subacquea hanno evidenziato una elevata torbidità della colonna d'acqua nei corpi idrici antistanti la foce del fiume Po con presenza di microfocci e filamenti mucilluginosi nella maggior parte delle stazioni monitorate. E' stata inoltre rilevata un'elevata presenza di numerosi esemplari del Ctenoforo *Mnemiopsis leidyi* (noce di mare) lungo tutto il litorale monitorato.

La campagna è stata eseguita nei giorni 16,18 e 19 settembre.

	Corpi Idrici					
parametri	CE1_1	CE1_2	CE1_3	CE1_4	ME2_1	ME2_2
Temperatura acqua (°C)	24.49	24.64	23.98	24.17	24.56	24.70
Salinità (PSU)	30.67	33.49	32.43	25.58	35.87	32.45
Ossigeno disciolto (%)	110.49	101.34	97.10	103.03	94.52	99.45
Ossigeno disciolto (ppm)	7.71	6.94	6.77	7.46	6.39	6.85
pH	8.29	8.32	8.27	8.32	8.32	8.30
Clorofilla "a" (µg/l)	1.48	1.46	1.53	1.84	0.28	1.04
Torbidità (FTU)	1.74	5.38	2.01	4.46	1.02	2.76



Mappe di distribuzione in superficie di temperatura, salinità, ossigeno disciolto

