Acque marino costiere. Nella **tabella** sono riportati i valori dei principali parametri rilevati in superficie con sonda multiparametrica, mediati per corpo idrico.

Dai dati riportati nella **tabella** sottostante la temperatura risulta pressoché omogenea nei corpi idrici monitorati, con solo qualche grado di differenza nelle aree CE1_1 e CE1_4, come evidenziato dalle **mappe di distribuzione**.


La salinità ha raggiunto valori più bassi in prossimità dei corpi idrici CE1_1 e CE1_4, rispettivamente di fronte al litorale di Caorle e al largo di Albarella.

L'ossigeno disciolto, come indicato in tabella, ha raggiunto valori inferiori alla percentuale di saturazione in tutti i corpi idrici monitorati, con valori più elevati in prossimità del corpo idrico ME2_2, al largo di Chioggia.

Le misure di trasparenza, effettuate mediante disco di "Secchi", sono risultate più elevate nelle stazioni al largo del litorale Isola Verde e di Pellestrina (VE), mentre i valori più bassi sono stati misurati nelle stazioni situate di fronte Po di Pila (RO); area in cui è stata rilevata la maggior torbidità.


Le osservazioni con telecamera subacquea hanno evidenziato una scarsa visibilità della colonna d'acqua e presenza di fiocchi e microfiocchi mucillaginosi nei corpi idrici situati a nord della Laguna di Venezia.

La campagna è stata eseguita nei giorni 9, 11 e 16 Novembre.



	Corpi Idrici					
parametri	CE1_1	CE1_2	CE1_3	CE1_4	ME2_1	ME2_2
Temperatura acqua (°C)	13.2	14.52	14.4	13.66	14.54	14.63
Salinità (PSU)	33.59	36.69	36.02	30.13	36.66	36.44
Ossigeno disciolto (%)	91.63	91.8	91.2	93.88	90.9	96.35
Ossigeno disciolto (ppm)	7.79	7.45	7.45	8.08	7.38	7.82
pH	8.17	8.19	8.17	8.16	8.2	8.19
Clorofilla "a" (µg/l)	0.77	1.26	1.21	2.95	1.59	1.6
Torbidità (FTU)	2.08	1.06	1.17	21.67	1.26	1.32

Mappe di distribuzione in superficie di temperatura, salinità, ossigeno disciolto



Unità Organizzativa Monitoraggio delle Acque Marine e Lagunari
e-mail: oaa@arpa.veneto.it