

Acque marino costiere. Nella **tabella** sono riportati i valori dei principali parametri rilevati in superficie con sonda multiparametrica, mediati per corpo idrico.

Dai dati riportati nella **tabella** sottostante la temperatura risulta pressoché omogenea nei corpi idrici monitorati, con solo qualche grado di differenza nelle aree CE1_2 e ME2_1, come evidenziato dalle **mappe di distribuzione**.

La salinità ha raggiunto valori più bassi in prossimità dei corpi idrici CE1_3, CE1_4 e ME2_2, rispettivamente a sud e al largo di Malamocco (VE, fronte Chioggia e al largo di Albarella).


L'ossigeno disciolto, come indicato in tabella, ha raggiunto valori superiori alla percentuale di saturazione in tutti i corpi idrici monitorati, con valori più elevati in prossimità dei corpi idrici CE1_1, antistante il litorale di Caorle, e ME2_2, al largo di Chioggia.

Le misure di trasparenza, effettuate mediante disco di "Secchi", sono risultate più elevate nelle stazioni al largo del litorale di Jesolo (VE), mentre i valori più bassi sono stati misurati nelle stazioni situate di fronte Rosolina e Barricata (RO).

Le osservazioni con telecamera subacquea hanno evidenziato una scarsa visibilità della colonna d'acqua e presenza di fiocchi e microfocchi mucilluginosi in quasi tutti i corpi idrici monitorati.

La campagna è stata eseguita nei giorni 4,14,15, 16 e 21 Settembre.

	Corpi Idrici					
parametri	CE1_1	CE1_2	CE1_3	CE1_4	ME2_1	ME2_2
Temperatura acqua (°C)	25.38	26.4	25.56	25.35	27.66	24.8
Salinità (PSU)	34.3	35.35	30.81	30.5	35.69	30.39
Ossigeno disciolto (%)	112.64	106.7	104.6	107.7	102.9	111.4
Ossigeno disciolto (ppm)	7.59	7.03	7.17	7.42	6.62	7.75
pH	8.19	8.46	8.45	8.45	8.42	8.46
Clorofilla "a" (µg/l)	1.48	1.6	1.34	2.66	1.17	2.37
Torbidità (FTU)	1.81	1.68	1.58	2.46	0.35	2.11



Mappe di distribuzione in superficie di temperatura, salinità, ossigeno disciolto

